

Viertes Verzeichnis von Neufunden höherer Pflanzen aus der Mark Brandenburg und angrenzenden Gebieten

Von

H. Scholz und H. Sukopp

In diesem vierten Verzeichnis wird von Neufunden oder Fundortsbestätigungen der letzten Jahre aus vielen Teilen der Mark Brandenburg bis einschließlich 1966 berichtet. Herr W. LEMKE, Jena, stellte Angaben von bemerkenswerten Pflanzenfundstellen nach Herbarbelegen, Beobachtungen und zugesandtem Bestimmungsmaterial zur Verfügung, soweit sie nicht schon in den früheren Mitteilungen dieser Serie berücksichtigt wurden. Es wurde versucht, aus allen eingegangenen Fundortsmeldungen eine sachgerechte Auswahl nach pflanzengeographischen Gesichtspunkten zu treffen, insbesondere auch im Hinblick auf neuzeitliche Veränderungen im Florenbild. Allerdings konnten wegen des nur beschränkt zur Verfügung stehenden Raumes keine Fundortsangaben über die Arten der Gattung *Carex* und der Familie der Orchidaceae von Herrn LEMKE zum Abdruck kommen.

Vorliegendes Verzeichnis enthält u. a. die ersten Mitteilungen von verschiedenen Vorkommen des *Rumex longifolius* in der Mark Brandenburg; die Art scheint sich in den Randbezirken Berlins einzubürgern und sei deshalb der speziellen Aufmerksamkeit der Floristen Mittelbrandenburgs empfohlen.

Angaben von F. BERGER, DAGEFÖRDE, E. FAHRENDORFF, H. FRITSCH, R. GÖRZ, K. HERSCHEL, HÜLSEN, H. KRÜGER, O. LADEMAN, E. PATZKE, M. SCHMATTORSCH, H. SCHMIDT, R. SCHULZ und A. STRECH wurden durch Herrn LEMKE übermittelt; ebenso Fundmeldungen von BLEY, GILBRECHT, KURTH, KONCZAK, NEUMANN, SCHADE, SCHMEJA, ULRICH, VOGEL, WIŚNIEWSKI und ZIMMERMANN durch Herrn Dr. W. FISCHER. Fundbeobachtungen von Herrn Dr. H.-D. KRAUSCH stammen, wenn keine Jahreszahl angegeben ist, aus den Jahren 1962 bis 1964.

Huperzia selago (L.) Martius: **Rg** Bruchwald südl. des Kölpinsees (Kr.).

Lycopodium annotinum L.: **Neustrelitz** Serrahn, Jg. 111 am Kl. Serrahn-See und viel am O-Ufer des Schweingarten-Sees 1963 (F.). **Pr** Weggun, Ostseite des Schulzensees 1950 (H. SCHMIDT). **Te** Wald am Fährsee 1949 (H. FRITSCH).

Diphasium complanatum (L.) Rothm.: **P** Pirsch-Heide südl. vom Hauptbhf. 1963 (F.).

Ophioglossum vulgatum L.: **B** Heiligensee, Wiese am Erlengraben, über 1000 Pflanzen 1964 (U. u. D. MÜLLER).

Botrychium lunaria (L.) Sw.: **Or** Hennigsdorf, Teufelsbruch 1959 (L.).

B. matricariifolium (Retz.) A.Br. ex Koch: **Pr** Weggun, Waldrand westl. vom Schulzensee 1950 (H. SCHMIDT). **B** Rahnsdorf, Nähe des S-Bahnhofs in ca. 400 Exemplaren 1965 (WEYMAR).

- Blechnum spicant* (L.) Roth: **Pe** Revier Kuhwinkel 1963 (F.).
- Asplenium trichomanes* L.: **St** Klosterfelde 1963 (WIŚNIEWSKI).
- Salvinia natans* (L.) All.: **P** Potsdam, Saupfuhl in der Parforce-Heide 1966.
Or Kremmen, Kremmener See in großen Mengen 1966 (KR.).
- **S. rotundifolia* Willd. = *S. minima* Bak.: **B** Zehlendorf, Schwarzer Grund, 1962 in einem Tümpel an der Gelfertstr. mit *Vallisneria spiralis*; offensichtlich von Aquarianern ausgesetzt, später nicht mehr. — Heimat: Mittel- und Südamerika. (SCH.)
- Sparganium erectum* L. subsp. *neglectum* (Beeby) Sch. et Thell.: **Zo** Graben an Viehweide am Weg Rangsdorf nach Großmachnow 1928 (L.). **Bz** Brück, Graben vor dem Schlußbusch 1932 (L.); Graben auf den Wiesen nördl. der Stadt 1936 (L.).
- Sp. minimum* Wallr.: **Rg** Moor nordwestl. Feldgrieben; Abflußgraben des Kölpin-sees bei Sellenwalde; Gräben nördl. des Zeuten-Sees; Gräben in den Tra-den-Wiesen; Moorschlenken am Steutzen-See (KR.). **B** Heiligensee, Sumpf-gelände südl. der Baumberge 1961 (U. u. D. MÜLLER).
- Potamogeton compressus* L.: **B** Spandau, Kuhlake 1963 (SCH.).
- P. acutifolius* Link: **Lychen** Wurlsee 1907 (F. BERGER). **B** Zehlendorf, Schwarzer Grund, Tümpel an der Gelfertstr. 1962 (SCH.).
- P. friesii* Rupr.: **Tr** Blankensee, in einer Bucht nahe Strandhotel 1927 (L.).
- P. pusillus* L.: **Tr** im Blankensee nahe dem Strandhotel 1927 (L.).
- Triglochin maritimum* L.: **B** Heiligensee, Sumpfwiese am Nordufer des Heiligen-sees 1962 (Su.). **P** Ostufer des Plessower Sees bei Werder 1962 (F.). **Tr** zw. Borkheide und Deutsch-Bork 1963 (WIŚNIEWSKI). **Zo** zw. Dabendorf und Gr. Machnow; westl. von Mittenwalde (KR.).
- Najas marina* L.: **Ra** Schollener See. Die von den dortigen Fischern „Seedorn“ genannte Pflanze war vor ca. 30 Jahren im See so häufig, daß sie das Fischen mit dem Netz behinderte. Sie ging dann plötzlich ganz zurück. Heute (1966) wieder ein kleiner Bestand in der Westbucht des Schollener Sees (KR.). **P** Nordufer des Seddinsees, ein angeschwemmtes Exemplar; Plessower See bei der Badeanstalt in Werder zahlreich 1963 (F.).
- Zannichellia palustris* L.: **Ra** Milow, in der Stremme 1963 (KONCZAK).
- Alisma lanceolatum* With.: **Sb** Fischteich am Sorgenteich bei Ruhland, leg. W. PIETSCH 1962 (SCH.).
- **Vallisneria spiralis* L.: **B** Zehlendorf, Schwarzer Grund 1962, in einem Tümpel an der Gelfertstr. mit *Salvinia rotundifolia*, offensichtlich von Aquarianern ausgesetzt, nach dem folgenden Winter nicht mehr vorhanden (SCH.).
- Bromus secalinus* L.: **P** Wilhelm-Külz-Str. 14, 1 Ex. verschleppt zwischen Pflastersteinen 1963 (F.). **L** Bollensdorf, Schutthaufen am Wege zu den Teichen 1952 (SCHMATTORSCH).
- B. racemosus* L.: **B** Spandau, Wiese nördl. der Heerstr. bei Amalienhof 1962 (SCH.); Tiefwerder-Wiesen nahe Tiefwerder 1962 (U. MÜLLER). **Rg** auf Feuchtwiesen bei Dollgow und am Kölpinsee vielfach häufig. **Gu** Feuchtwiesen bei Jänschwalde (KR.).
- B. ramosus* Huds.: **B** Spandau, bei der Zitadelle unter Gebüsch am Havelufer 1965, Belegexemplar steril! (SCH.); **D** Rinower Bruch 1951 (PATZKE).
- B. benekenii* (Lge.) Trimen: **Tr** Ludwigsfelde, Gartenzaun 1951 (L.).
- **B. madritensis* L.: **B** Friedenau, unter Serradella auf dem Mittelstreifen der Rheinstr. 1966 (SCH.).

- **B. lepidus* Holmberg: **B** Charlottenburg, an der Stadtautobahn am Messedamm 1964, wahrscheinlich mit Rasensaat eingeschleppt. Erster sicherer Nachweis dieser Art für Berlin! (SCH.).
- **B. carinatus* Hook. et Arn. = *Ceratochloa carinata* (Hook. et Arn.) Tutin: **B** Dahlem, am Pücklerteich und am Käuzchensteig; desgl. am Fohlenweg Ecke Pücklerstr.; an allen Stellen in zahlreichen Individuen seit 1962 beobachtet; Dahlem, Straßenrand der Altensteinstr. 1965 (SCH.).
- Festuca heterophylla* Lam.: **Bz** im NSG Kl. Marzehns 1963 (SCHMEJA).
- **F. tenuifolia* Sibth. = *F. capillata* Lam.: **Or** Hennigsdorf, trockene Böschung zum Mühlgraben 1959 (H. FRITSCH); **B** Diese atlantisch bis subatlantisch verbreitete Grasart ist im Berliner Raum nicht heimisch. Schon seit längerer Zeit wurde sie vielfach mit Grassaaten eingeschleppt, so daß sie heute im Gebiet stellenweise als völlig eingebürgert gelten kann. Es liegen zahlreiche Fundmeldungen vor (PATZKE, SCH., SU.). **He** Lebusa nördl. des Dorfes 1952 (PATZKE).
- F. psammophila* (Hack.) Kraj.: **B** Waidmannslust, Rollberge 1966, confirm. MARKGRAF-DANNENBERG (SCH.). **Tr** Galgenberg, Nordteil 1927, 1931; Löwendorfer Berg bis Schönhagener Landstraße 1928; alle Belege rev. MARKGRAF-DANNENBERG (L.).
- F. caesia* Sm. subsp. *caesia*: **B** Heiligensee, Baumberge im Festuco-Koelerietum glaucae 1959; Wannsee, südwestl. Golfplatz 1959 (PATZKE).
- **F. vallesiaca* Schleich. subsp. *pseudovina* (Hack.) Hegi: **B** Steglitz, Rasen vor dem Finanzamt an der Schloßstr. 1959. Offenbar aus Rasensaaten und vermutlich noch häufiger zu erwarten. (PATZKE)
- Vulpia myuros* (L.) Gmel.: **J** Bhf. Uckro 1951 (PATZKE). **Fb** Neuzelle, Roggenfeld südl. der Diehloer Berge 1932 (LADEMANN).
- Scolochloa festucacea* (Willd.) Link: **B** Tegel, Valentinswerder 1962, leg. WOLF (SU.); Spandau, Tiefwerder-Wiesen 1962 (WERNICK); Wannsee, Havelufer nördl. der Glienicker Brücke 1965 (SCH.); Forst Oberspree, bei Schöneiche (WEYMAR).
- Poa bulbosa* L.: **P** Kleinmachnow, Weg an der Försterei 1923. **Tr** im Park 1928 (L.). **D** zw. Kemnitz und Schlagsdorf 1951 (SCHMATTORSCH).
- **P. chaixii* Vill.: **B** Charlottenburg, Westrand des Schloßparks Charlottenburg 1965; Wannsee, Böttcherberg nahe der Ruine 1965 (SU.).
- Catabrosa aquatica* (L.) P.B.: **Fb** Neuzelle, Oderwiesen 1922 (L.).
- **Lolium temulentum* L.: **B** Schöneberg und Friedenau, unter Serradella auf dem Mittelstreifen der Haupt- und Rheinstr. 1966 (SU.); Lichterfelde, Luzerner Str., aus Vogelfutter 1966 (LEUCKERT).
- L. remotum* Schrank: **Tr** Ludwigsfelde, unter Serradella 1951 (L.). **L** Schwebendorf, Leinfeld 1952 (SCHMATTORSCH).
- **L. rigidum* Gaud.: **B** Friedenau, unter Serradella auf dem Mittelstreifen der Rheinstr. 1966 (SCH.).
- **Agropyron trachycaulum* (Link) Malte: **B** Grunewald, Trümmerberg am Teufelssee 1962 (SCH.).
- **Hordeum jubatum* L.: **Pasewalk** Salzwiesen auf der Flur „Freiheit“ im Randow-Bruch nördl. Zerrenthin mit *Aster tripolium*, *Glaux maritima*, *Spergularia salina*, *Centaureum pulchellum*, *Scirpus tabernaemontani* u. *Scirpus maritimus* (KR.). **B** Kreuzberg, Schuttgelände des ehem. Schöneberger Hafens 1964 (SCH. u. SU.); Grunewald, Trümmerberg am Teufelssee 1962 (SCH.).

- Elymus arenarius* L.: Tr Galgenberg, Gruben im Nordteil, in dichten Beständen 1927. Zo Mellensee, Bahndamm nördl. des Ortes 1925 (L.).
- **E. virginicus* L.: B Grunewald, Trümmerberg am Teufelssee 1962. — Heimat: Nordamerika (SCH.).
- **Cynodon dactylon* (L.) Pers.: B Steglitz, Munsterdamm, auf dem Mittelstreifen am Hanstedter Weg 1965; Spandau, große Kolonie an der Götzelstr. 1966 (SCH.); Tiergarten, Klopstockstr., betretener Rasen 1966 (SU.).
- **Eleusine indica* (L.) Gaertn.: B Köpenick, nordöstl. Bhf. Köpenick in einem Zwiebfeld 1959—1962 (SCHULTKA).
- **Aira elegans* Willd. = *A. capillaris* Host non Lagasca: Die Art wurde in Berlin nicht beobachtet. Siehe unter *A. caryophyllea* subsp. *multiculmis*. (SCH.)
- A. caryophyllea* L.: Ge Sandtrockenrasen südl. des Ausbaues Geuen 1966 (KR.). B Schöneberg, Baustelle auf dem Südgelände 1965 (SCH.); Forst Düppel, Jg. 60, 1959 (SU.). Gu Pienow, an der Chaussee nach Lieberose 1931 (LADEMANN).
- **A. caryophyllea* L. subsp. *multiculmis* (Dum.) A. et Gr. ex Hegi: B Dahlem, Ihnestr. 1958. Der in VBVB 98—100 (1960): 27 verzeichnete Name *A. capillaris* ist zu berichtigen. (SCH.)
- A. praecox* L.: Ra Ebelgünder Moor, am Waldweg zahlreich 1962 (F.). B Kladow, Abhang am Gr. Glienicker See 1964; Grunewald, Havelhöhe bei Steinlanke, Jg. 128, 1965 (SCH.); D Sandgrube nördl. Mehlsdorf 1951 u. Ostrand des Schwebendorfer Holzes 1952 (SCHMATTORSCH).
- **Avena nuda* Höjer emend. Mansf. subsp. *strigosa* (Schreb.) Mansf.: B Friedenau, unter Serradella auf dem Mittelstreifen der Rheinstr. 1966 (SCH.).
- **Agrostis castellana* Boiss. et Reut.: B Diese aus dem westl. Mittelmeergebiet stammende Art wurde in den letzten Jahren in Berlin verschiedentlich in der Nähe von Grünanlagen, an Straßenrändern etc. verwildert beobachtet. Sie gelangt unter dem Namen *Agrostis tenuis* Highland Bent mit amerikanischen Importen in das Gebiet und ist heute ein häufiger Bestandteil von käuflichen Zierrasenmischungen. Die Art ist winterhart. Die zukünftigen Jahrzehnte werden zeigen, ob sie ein fester Bestandteil der Berliner Flora werden wird. Neuere Literatur: H. SCHOLZ in Ber. Dtsch. Bot. Ges. 78: 322—325, 1966 und W. LINDENBEIN in Saatgut-Wirtschaft Nr. 8: 273 bis 274, 1966. (SCH.)
- Alopecurus myosuroides* Huds.: B Kreuzberg, Schuttgelände des ehem. Schöneberger Hafens 1964; Charlottenburg, an der Stadtautobahn am Messe-damm 1964 (SCH.).
- Stipa capillata* L.: P Leest, am Galgenberg, mit *Phleum phleoides* 1963 (KONCZAK); Pannenberg bei Bornim, nur wenige Exemplare 1966 (KR.).
- St. joannis* Čelak.: P Stahnsdorf, Nordufer des Teltowkanals wenige Halme adv. 1922 (L.).
- **St. neesiana* Trin. et Rupr.: Nr Neu-Ruppin, leg. WARNSTORF 1881 als *St. capillata* (Herb. Bot. Museum Berlin-Dahlem). Offensichtlich eingeschleppt. — Heimat: Südamerika. Die Art gilt in weiten Teilen der Erde als Wolladventiv- und Ballastpflanze (vgl. R. PROBST, Wolladventivflora Mitteleuropas, Solothurn 1949). Mit vorliegender Bestimmung ist die Angabe des Vorkommens von *St. capillata* in W. FISCHER, Flora des Ruppiner Landes, Potsdam 1964 (Veröfftl. Bezirksheimatmuseums Potsdam, Heft 5) zu streichen. (SCH.)

Hierochloe odorata (L.) P.B.: **B** Wannsee, Pfaueninsel, Kuhbucht und Parschenkessel mit *Veronica longifolia* 1963, 1966 (Su.); Havelufer von der Lieper Bucht bis zur Gr. Steinlanke 1964 (SCH. u. Su.). **P** auf dem Grünstreifen zwischen Radfahrweg und Fahrbahn der Templiner Chaussee unweit der Eisenbahnbrücke ein größerer Bestand (KR.).

Echinochloa utilis* Ohwi et Yabuno = *E. frumentacea* auct. non Link: **B Steglitz, auf Schutt am Carmerplatz 1963; Munsterdamm 1965 mit *Panicum miliaceum*; Lichterfelde, Luzerner Str. 1965, leg. LEUCKERT. — Kulturform von *E. crus-galli* (L.) P.B. aus Ostasien. Wird auch in den USA als Futterpflanze kultiviert (Japanese barnyard millet). Herkunft der Berliner Pflanzen wahrscheinlich aus Vogelfutterabfällen. Neuere Literatur: OHWI in Phytotax. Geobot. 20 (1962): 50—55 und YABUNO in Cytologia 27 (1962): 296—305. (SCH.)

Panicum capillare* L.: **B Spandau, Sportplatz in den Freiheitswiesen bei Tiefwerder 1965 zahlreich, 1966 ein Ex.; Grunewald, Bhf. Grunewald 1965 (ZACHARIAS); Charlottenburg, Kurt-Schumacher-Damm südl. Hinckeldey-Brücke 1955 (Su.); Tiergarten, Beusselstr. 1964 (SCH.); Kreuzberg, Simeonstr. 1955 (Su.).

Setaria verticillata (L.) P.B.: **B** Kreuzberg, Simeonstr. 1955 (SCH. u. Su.).

S. decipiens* C. Schimper: **B Friedenau, unter Serradella auf dem Mittelstreifen der Rheinstr. 1966 (SCH.).

S. italica (L.) P.B. subsp. *moharia* (Alef.) Körn.: **B** Charlottenburg, Schuttgelände bei den Messehallen 1963 (SCH.).

Sorgum halepense* (L.) Pers.: **B Spandau, Müllplatz bei den Egelpfuhlwiesen 1962. — Heimat: Mittelmeergebiet. (SCH.)

Cyperus fuscus L.: **Rg** sandiger Grabenaushub am Waldrand nördl. des Zeuten-Sees (KR.).

C. houghtonii* Torr.: **B Tegel, Konradshöhe, Am Krähenberg, Straßenrand, dort seit ca. 1963 bekannt, auch heute noch, det. SCHULTZE-MOTEL (D. MÜLLER).

Eriophorum gracile Koch: **Rg** Zwischenmoor am Nordufer des Glawke-Sees (KR.).

Schoenoplectus tabernaemontani (Gmel.) Palla = *Scirpus tabernaemontani* Gmel.: **B** Wittenau, Sumpfwiese am Bhf. Rosenthal 1962; Tempelhof, Blanke Helle 1962. — Neuere Literatur: BAKKER in Acta Bot. Neerlandica 3 (1954): 425—445 und D. OTZEN l.c. 11 (1962): 37—46 (SCH.). **Br** Weißes Fenn nördl. Marzahne (F.). **P** Saarbruch bei Krielow mit *Bolboschoenus maritimus* und *Juncus gerardii* (KR.).

Isolepis setacea (L.) R.Br.: **B** Heiligensee, in einer Ackersenke nördl. des Wiesengrabens 1966 (U. u. D. MÜLLER). **Br** Bohnenländer See (VOGEL).

Eleocharis quinquiflora (Hartm.) O. Schwarz.: **Te** Lychen, Waldweg am Obersee 1892 leg. HEILAND; die Pflanze lag im Herbarium Bot. Museum Berlin-Dahlem unter *Scirpus palustris* var. *arenarius* (SCH.-M.).

Cladium mariscus (L.) Pohl: **P** Mittel-See bei Lehnin 1963 (F.).

Rhynchospora alba (L.) Vahl: **Br** Weißes Fenn nördl. Marzahne 1963 (F.).

Carex dioica L.: **Gr** Zwischenmoor im Tal des Pölzer Fließes östl. Buchholz. **Rg** Zwischenmoor nördl. des Kl. Dagow-Sees; Zwischenmoor nördl. des Zeuten-Sees 1962, durch Melioration zurückgegangen, 1964; Zwischenmoor nördl. und westl. des Glawke-Sees bei Zechlinerhütte, dort stellenweise sehr reichlich (KR.). **Br** Diebesgrund bei der Silberquelle 1962 (F.).

- C. appropinquata* Schum.: **Rg** im Stechlinsee-Gebiet nicht selten (Kr.). **P** Potsdam, Saupfuhl in der Parforce-Heide 1966 (Kr.).
- C. brizoides* Jusl.: **Fi** NSG „Schadewitz“ südl. Schadewitz; Buchwald bei Doberlug 1963. **Ky** Jg. 42 am W-Ufer des Untersees, im Erlbruch 1963 (F.).
- C. bohémica* Schreb.: **L** Teiche zw. Riedebeck u. Bornsdorf 1962 (F.).
- C. cespitosa* L.: **Rg** Polzow-Tal östl. Menz; Wiesen am Glawke-See bei Zechlinerhütte (Kr.).
- C. tomentosa* L.: **L** an der Chaussee nach Schlabendorf bei Kahnsdorf, im Eumolinietum auf Beckenton 1962, von hier bereits von RABENHORST (bei ASCHERSON 1864) genannt (F.).
- C. digitata* L.: **Bz** zw. Kl. Briesen und Ragösen, im Eichen-Hainbuchenwald (F.).
- C. sylvatica* Huds.: **Fi** Friedersdorfer Tiergarten; Buchwald bei Doberlug 1963 (F.).
- C. distans* L.: **Br** zahlreich im Diebesgrund beim Gränert 1962 (F.). **B** Heiligensee, Tümpel am Mattenbuder Pfad 1964 (D. MÜLLER).
- Wolffia arrhiza* (L.) Wimm.: **B** Nordufer des Müggelsees östl. Fischerei-Institut 1956 (SCHULTKA); Müggelheim, Tümpel etwa 200 m östl. Bauersee 1966 (WA., WEYMAR). **Ge** Ziesar. Das von C. VOGEL entdeckte Vorkommen bei Ziesar ist in VBVB 102 (1965): 11 infolge eines Druckfehlers nicht deutlich genug lokalisiert worden. Es handelt sich bei diesem Fundort um mehrere Tümpel (alte verwachsene Lehmgruben) unmittelbar südl. des Ausbaues Geuen, etwa 3 km südl. von Ziesar. Hier wächst *Wolffia arrhiza* in großen Mengen zusammen mit *Lemna minor*, *L. trisulca* und *Spirodela polyrrhiza* (1966). **P** Herta-See bei Michendorf, Ostseite 1966; Friedensteich im Park Sanssouci, hier zusammen mit *Lemna minor*, *L. gibba*, *L. trisulca* und *Spirodela*; Drewitz, Nuthe-Altwasser an der Chaussee nordwestl. des Dorfes, hier mit den gleichen Arten wie im Friedensteich (Kr.); Görlsdorfer Fenn bei Lehnin in Mengen, zusammen mit den übrigen 4 Lemnaceen-Arten 1963 (F.).
- Juncus tenageia* Ehrh.: **B** Mariendorf, an einem Feldtümpel zw. Wildspitzweg und Britzer Str. 1962 (SCH.).
- J. squarrosus* L.: **Eb** Birkenwerder, an der Briesen 1922 (FAHRENDORFF). **J** Waldweg zw. Ihlow und Mehlsdorf 1951 (SCHMATTORSCH).
- J. filiformis* L.: **Br** Bohnenländer See (VOGEL). **Sommerfeld** (Lubsko) Ossiger Bruch 1931 (LADEMANN).
- J. capitatus* Weigel: **D** bei Glienic und zw. dem Galgenberg und der Moose 1951 (PATZKE).
- J. alpinus* Vill.: **B** Heiligensee, Wiesen am Nordufer des Sees 1962 (Su.); Köpenick, Teufelssee/Müggelberge, leg. EICHNER (SCH.). **Tr** Ludwigsfelde, Birkenmoor an der Autobahn 1950 (L.).
- Luzula albida* (Hoffm.) DC.: **B** Wannsee, an der Potsdamer Chaussee östl. Bhf. Wannsee 1965 (SCHWANDT), 1967 (WA.).
- L. pallescens* (Wahlbg.) Sw.: **B** Rudow, trockene Stellen am Lolopfuhl 1962 (SCH.).
- Colchicum autumnale* L.: **Na** Wiese bei Zeestow (ZIMMERMANN).
- Anthericum liliago* L.: **Ra** am Lüttgen-Berg zw. Bamme u. Gränigen 1963 (WIŚNIEWSKI). **Tr** Glauer Berge, am Weg nach Trebbin 1928 (L.). **Bz** Brück, Waldweg nördl. der Stadt 1934 (L.).
- Gagea villosa* (M. Bieb.) Duby = *G. arvensis* (Pers.) Dum.: **B** Wannsee, Volkspark Glienicke 1954—1965 (KOCH).

- G. lutea* (L.) Ker-Gawl.: Pr Gramzow, im Zehnebecker Wald 1953 (H. SCHMIDT).
- Allium scorodoprasum* L.: B Wannsee, Volkspark Glienicke 1962 (SCH.).
- A. angulosum* L.: B Wittenau, feuchte Wiese beim Bhf. Rosenthal 1962 (SCH.); Wannsee, Pfaueninsel, nahe Parschenkessel 1963 (Su.).
- **A. paradoxum* (M.B.) Don: Eb Joachimsthal, bei Pazlow am verlandeten Mellensee 1961 (RIECK). KöW am Ortseingang von Senzig in Abteilung 202 des Tiergartens, seit ca. 30 Jahren, 1966 (HENOW).
- **Scilla sibirica* Haworth: P Marquardter Park eingebürgert, 1963 (F.).
- **Ornithogalum umbellatum* L.: B Heiligensee, Wiese am Eschengraben am Nordrand der Baumberge 1963 (U. u. D. MÜLLER).
- **O. nutans* L.: P Schloßpark Petzow noch heute reichlich (schon ASCHERSON 1864: 720), außerdem in einem unkrautreichen Laubwaldbestand mit *Quercus robur*, *Acer platanoides*, *Chelidonium maius*, *Anthriscus*, *Geranium robertianum* südl. von Petzow am Schwielowsee (KR.).
- **O. boucheanum* (Kunth) Asch.: B Friedrichsfelder Park 1907 (DAGEFÖRDE).
- Epipactis atrorubens* (Hoffm.) Schult.: B am Uferweg des Gosener Kanals bei Schmöckwitz 1965 (BR. SCHULZ).
- Neottia nidus-avis* (L.) Rich.: B Forst Spandau, Jg. 69, 1966 (U. HAMANN).
- Goodyera repens* (L.) R.Br.: B Rahnsdorf, Nähe des S-Bahnhofs 1965 (WEYMAR).
- **Salix dasyclados* Wimm.: Br Buhnenhaus 1913. P Werder, Göttingsee 1921 (GÖRZ); Kleinmachnow, Parkstück an der Eigenherdsschule 1946. Bz Brück, Graben nördl. am Linther Oderbusch 1933/34 (L.). D Mündung der Bache in die Dahme; Schloßplatz, Zagelsdorfer Chaussee 1951, 1952 (SCHMAT-TORSCH).
- Parietaria erecta* M. et K.: B Bez. Mitte, auf dem Gelände der Charité 1952 (L.); Charlottenburg, Schloßpark Charlottenburg südwestl. Mausoleum 1965 (Su.); Steglitz, Brentanostr. in einem Garten seit 1935, 1962 (BARTH u. Su.).
- Aristolochia clematitis* L.: Pr Weggun, Dorfanger 1950 (H. SCHMIDT). Tr Zaun der Landesschule 1949 (H. FRITSCH). Zo Weinberge 1953 (L.). P Kemnitz 1963 (F.). Sto Gartenzaun 1963 (NEUMANN).
- **Rumex patientia* L.: Tr auf der „Breite“, Wegrand 1922 (L.).
- **R. longifolius* DC. = *R. domesticus* Hartm.: B Spandau, Müllplatz bei den Egelpfuhlwiesen 1962; Grunewald, Trümmerberg am Teufelssee 1962; Buckow, Straße 46, 1962; Mariendorf, an der Straße 206, 1963; Marienfelde, am Gutshof 1963; Tegel, an der Lauenburger Zeile 1966; Buckow, auf ehem. Gärtneriegelände an der Goldammerstr. 1966. — Bisher ist diese boreal-eurasische Art aus der Mark Brandenburg noch nicht nachgewiesen worden. Abgesehen von einigen adventiven Vorkommen im sächsischen Hügelland, im Thüringer Becken und im mittleren Saaletal, verläuft in Deutschland die Südgrenze der Verbreitung im nördlichen Holstein (vgl. K.-H. RECHINGER in HEGI, Illustrierte Flora von Mitteleuropa 3, 2. Aufl. München 1958). Standörtlich bevorzugt die Art in Berlin — bis auf das Vorkommen auf Trümmerschutt — Ruderalgelände in ländlicher Umgebung. Weitere Funde und lokale Einbürgerungen im weiten Umkreis von Berlin sind wahrscheinlich. Die Art ist leicht kenntlich durch große schwiellose Valven und durch die schon in den späten Frühjahrswochen einsetzende Fruchtreife. (SCH.)

- **Polygonum kitaibelianum* Sadl.: B Charlottenburg, Schuttgelände bei den Messehallen 1963. — Heimat: östl. Mittelmeergebiet, Vorderasien. Neue Literatur: H. SCHOLZ in Hessische Floristische Briefe 10 (1961): 17—19. (SCH.)
- **P. sachalinense* F. Schm. ex Maxim.: B Grunewald, Trümmerberg am Teufelssee, mit *P. cuspidatum* Sieb. et Zucc. 1965 (SCH.).
- Chenopodium bonus-henricus* L.: Tr Christinendorf, Dorfaue 1946 (L.).
- Ch. vulvaria* L.: P Babelsberg, in der Lutherstr. 1963 (F.).
- Ch. murale* L.: B Steglitz, Albrechtstr. am Stadtpark 1962 (SCH.).
- Ch. ficifolium* Sm.: Na salzhaltige Äcker im Luch 1930 (H. KRÜGER).
- **Atriplex nitens* Schkuhr: P Schuttplatz auf den Nuthewiesen am Horster Weg 1963 (F.). Tr Ludwigsfelde, nahe der Autobahnbrücke 1951 (L.).
- **A. hortensis* L.: Fw Berkenbrück, BW-Haus westl. vom Bahnhof 1963 (F.).
- **Amaranthus albus* L.: Crossen (Krosno) Rädnitz, am Bahnhof 1944 (STRECH).
- **A. spinosus* L.: B Lichtenberg, Stadtpark, neu angelegte Grünanlage 1959 (SCHULTKA).
- **A. chlorostachys* Willd.: B Dahlem, an einem Maisfeld in der Lansstr. 1965; Neukölln, Volkspark Hasenheide 1966; Grunewald, Trümmerberg am Teufelssee 1960, spärlich 1962; Stölpchensee, ehem. Schuttplatz am Kernforschungsinstitut 1960; Lichterfelde, Trümmerberg am Stichkanal 1960 (SCH.).
- Portulaca oleracea* L.: B Spandau, Behnitzkirche 1956; Spandau, Münsinger Platz 1961 (WERNICK); Forst Grunewald, Schurf Fläche im Jg. 85, 1965 (DE.); Tiergarten, Tiergartenstr. 1953 (SU.); Wuhlheide, Gärtnerei im Pionierpark 1958—1963; Köpenick, in verschiedenen Gärtnereien 1963 (SCHULTKA); Wannsee, Pfaueninsel 1966 (SU.).
- **Montia perfoliata* (Willd.) Howell = *Claytonia perfoliata* Willd.: B Grunewald, Delbrückstr. 1966 (CHRISTOPH); Steglitz, an der Matthäuskirche 1966 (SU.); Lankwitz, Gemeindepark (SCHWANDT); Zehlendorf, Finkensteinallee, Späths Baumschulen 1966 (CH. SCHNEIDER); Lichterfelde-Ost, Jungfernstieg, Garten 1965 (MÜNDEL); Lichtenrade, Gärtnerei Lorberg 1962, 1966 (CHRISTOPH); Wuhlheide, Gärtnerei im Pionierpark 1958 bis 1963 (SCHULTKA). Lb Lübbenau, Grünanlagen an der Maxim-Gorki-Str., Anfang Mai 1966 in großen Mengen (KR.).
- **Silene csereii* Baumg.: B noch heute nach wenigstens 10 Jahren auf Trümmergrundstücken in der Alexandrinenstr. im Bezirk Kreuzberg (vgl. VBVB 98—100: 35, 1960) (SCH. u. SU.).
- **S. conica* L.: B Forst Oberspree, bei Fichtenau (WEYMAR). Od am Fuße des Pimpinellenberges auf einem sandigen Fußweg durch ein Festuco-Koelerietum glaucae, mit *Alyssum montanum* (KR.).
- **S. dichotoma* Ehrh.: P sandiges Aufschüttungsgelände an der Templiner Chaussee kurz vor dem Eisenbahndamm in großen Mengen 1963, vereinzelt auch auf dem Bahndamm selbst (KR.); Teltow, an der Potsdamer Str. 1942. Tr Ludwigsfelde, an der Autobahn 1949. Meyenburg Schmolde, Ackerland 1952 (L.).
- S. tatarica* (L.) Pers.: B Tiergarten, Gelände der Großmarkthalle an der Beusselstraße 1959 (FU-Exk.).
- S. otites* (L.) Wibel: B Wannsee, Pfaueninsel südl. des Heidestückes 1961 (SU.). Or an der Nordbahn zw. Grünberg und Löwenberg 1963 (BLEY).
- **Lychnis chalconica* L.: B Schöneberg, an der Potsdamer Str. beim Kleistpark 1963, leg. HEJNÝ. — Verwilderte Zierpflanze aus Südosteuropa. (SCH.)

- Melandrium rubrum* (Weigel) Garcke: B Forst Tegel, Jg. 89, 1961 (K.ERNST); Tegel, Reiherwerder 1964 (SU.); Tiergarten, Südteil des Gr. Tiergartens 1966 (KUNICK, LEUCKERT); Lankwitz, Gemeindepark (SCHWANDT); Zehlendorf, unter Gebüsch Am Hegewinkel 1966 (SCH.); Lichtenrade 1962 (FU-Exkursion).
- M. noctiflorum* (L.) Fries: P verschiedentlich in Ackerunkrautgesellschaften bei Groß Kreutz, Deetz und Götz 1966 (ADAM).
- **Gypsophila paniculata* L.: B selten an Wegrändern, wohl meistens aus Gärten verwildert. Frohnau, zw. Bhf. und Jg. 96, 1953; Spandau, Tiefwerder Weg am ehem. Elsgraben 1954 (SCH. u. SU.); Bez. Kreuzberg, Trümmerschüttungen an der Alten Jakobstr. 1964 (SU.); Grunewald, Trümmerberg am Teufelssee 1960; Schöneberger Südgelände nahe „Insulaner“ 1960 (SCH.); Müggelheim, am Weg zur Krummen Laake 1959 (SU.).
- Vaccaria pyramidata* Med.: B Malchow, Kolonie Märchenland, Wegrund 1955 (SCHULTKA); Lankwitz, Mühlenstr. 1965 (SCHWANDT); Mariendorf, Volkspark 1962 (SCH.).
- Cerastium brachypetalum* Pers.: Fb Neuzelle, Diehloer Berge 1932 (LADEMANN).
- Sagina apetala* Ard.: B Reinickendorf, Ausstiche bei Wilhelmsruh 1947, det. QUELLE (STR.); Rudow, feuchte Plätze auf einem Acker am Heroldweg 1965 (SCH.).
- Arenaria leptoclados* (Rchb.) Guss.: B Rudow, Brachacker am Wildmeisterdamm 1965. Na Zeestow 1912, leg. R. SCHULZ als *A. serpyllifolia* L. (Herbar Bot. Museum Berlin-Dahlem) (SCH.).
- Corrigiola litoralis* L.: B Forst Grunewald, bei Forsthaus Dachsberg 1960 (BUSSELER). Rg an der Straße Menz—Rheinsberg südl. des Nehmitz-Sees mit *Herniaria glabra*, *Scleranthus perennis*, *Polygonum aviculare* (KR.).
- Ceratophyllum submersum* L.: B Spandau, Festungsgraben beim Klärwerk Ruhleben 1963 (SCH.); Rudow, Lolopfuhl 1962; Rudow, Klarpfuhl 1966. — Die zahlreichen, auch durch Herbarmaterial belegten Fundstellen dieser Art in Berlin aus dem letzten Jahrzehnt wurden von MEUSEL u. MÜHLBERG in HEGI, Illustrierte Flora von Mitteleuropa 3, 3 (1965) nicht berücksichtigt, weshalb an dieser Stelle noch einmal darauf hingewiesen werden soll: VBVB 98—100 (1960): 36 u. l.c. 102 (1965): 18 (SCH.). P Nordseite der Rudören-Insel am Trebel-See bei Ketzin; Schlanitz-See bei Uetz 1963 (KONCZAK); Hertha-See bei Michendorf 1966 (KR.).
- Actaea spicata* L.: Fw Buchenwald am Westufer des Kl. Glietzen-Sees (KR.).
- Anemone* × *lipsiensis* Beck = *A. ranunculoides* L. × *A. nemorosa* L.: B Schloßpark Charlottenburg noch vorhanden 1961 (K.ERNST).
- Myosurus minimus* L.: B Wittenau, 1962 an der Quickborner Str. mit *Anthoceros* (SCH.); Ackerrand am Nordgraben 1962 (U. u. D. MÜLLER); Mariendorf, an einem Feldtümpel zw. Wildspitzweg und Britzer Str. 1962; Buckow, feuchter Roggenacker am Einsiedlerweg 1962; Buckow, Heroldweg 1965 (SCH.); Forst Grunewald, Havelufer an der Gr. Steinlanke, in der Aue 1965 (SCH.-M.). P bei Götz im Papaveretum argemone 1966 (ADAM).
- Ranunculus sardous* Crantz: B Lankwitz, Malteser Str. 1964 (SCHWANDT); Buckow, am Einsiedlerweg 1962 (SCH.); Siemensstadt, westl. Kraftwerk Reuter 1957 (SCH.); Wittenau, nördl. Wilhelmsruher Damm 1961 (FU-Exkursion).
- R. lanuginosus* L.: Fi Friedersdorfer Tiergarten bei Sonnenwalde 1963 (F.).

- R. circinatus* Sibth.: Pr Lützlow, im Lützlower See 1953 (H. SCHMIDT).
- R. trichophyllus* Chaix: Pr Weggun, Graben am „Torfloch“ 1952 (H. SCHMIDT).
- Fumaria officinalis* L. subsp. *wirtgenii* (Koch) Arcang.: Tr Ludwigsfelde, Sandweg zur Autobahn 1948 (L.).
- **Brassica elongata* Ehrh. subsp. *armoracioides* (Čern.) Schmalh.: St Rüdersdorf, Kalkhalde 1925 (L.).
- **B. juncea* (L.) Čern.: P Stahnsdorf, sandiger Wegrand südl. der Chaussee nach Potsdam 1926 (L.).
- **B. nigra* (L.) Koch: P Stahnsdorf, an der Machnower Schleuse 1926 (L.).
- **Erucastrum gallicum* (Willd.) O. E. Schulz: B Spandau, ehem. Müllplatz bei den Egelpfuhlwiesen 1962; Uferweg an den Tiefwerder Wiesen 1962; Grunewald, Trümmerberg am Teufelssee 1962; Kreuzberg, mehrfach auf abgeräumten Trümmerflächen 1953, 1964 (SCH.); Schöneberg, Schuttfläche zw. Haupt-, Rubens- und Eisackstr. 1966 (ZACHARIAS).
- **Hirschfeldia incana* (Jusl.) Lagr.-Foss.: B Grunewald, Trümmerberg am Teufelssee 1965; Zehlendorf, Andrézeile Ecke Pfarrlandweg 1962 (SCH.).
- **Sinapis alba* L.: B Gatow, Acker westl. des Dorfes 1953—1964 (KOCH); Bez. Kreuzberg, Sportplatz Lobeckstr. 1964 (SCH. u. SU.).
- **Rapistrum rugosum* (L.) All.: B Schöneberg, aufgelassene Kleingärten an der Wexstr. 1966 (SCH. u. SU.); Buckow, am Rufacher Weg 1963 (SCH.).
- **Conringia orientalis* (L.) Dum.: B Lichtenberg, nördl. der Schuttkippe Friedrichsfelde östl. Tierpark auf einem Brachacker 1955—1960 (SCHULTKA).
- **Lepidium virginicum* L.: B Tegel, Humboldtmühle 1960 (SU.); Friedrichshain, Frankfurter Allee Ecke Waldeyer Str. 1958 (SCHULTKA); Nikolassee, Mattherhornstr. nahe Spanische Allee 1965 (WA.).
- **L. campestre* (L.) R.Br.: B Spandau, Müllschüttung bei den Egelpfuhlwiesen 1962 (SCH.); Forst Düppel, Südrand von Jg. 86, bis 1960 (KOCH); Wannsee, zw. Potsdamer Chaussee und dem S-Bahnhof 1964, 1967 (WA.).
- **L. perfoliatum* L.: B Lankwitz, Böschung des Teltow-Kanals 1963 (SCHWANDT).
- **L. densiflorum* Schrad.: P Schuttstelle am Horster Weg 1963 (F.).
- **L. heterophyllum* (DC.) Benth.: B Wilmersdorf, Wiese im Volkspark 1964 (SCHWANDT).
- Coronopus squamatus* (Forsk.) Asch.: Fb Neuzelle, Weg zur Oder 1922 (L.).
- Thlaspi perfoliatum* L.: B Dahlem, Fabeckstr. bei der Schwendener Str. 1964 (SCH.).
- **Th. alpestre* L.: B Wannsee, Volkspark Glienicke 1964 (SCHWANDT).
- Neslia paniculata* (L.) Desv.: Ca Drebkau, am Bahnhof 1922 (FAHRENDORFF).
- **Bunias orientalis* L.: B Steglitz, Nordseite des Teltow-Kanals zw. Birkbuschbrücke und Kirchnerbrücke 1963 (SCHWANDT); Tempelhof, Alboin- Ecke Arnulfstr. am Friedhof 1960—1964 (D. MÜLLER); Marienfelde, zahlreich am Diedersdorfer Weg nahe Stadtgrenze 1963 und später (SCH.); Wuhlheide, Bahndamm südl. Bhf. Wuhlheide 1963 (SCHULTKA).
- Cardamine hirsuta* L.: B Grunewald, an der Havelchaussee nördl. Steinlanke 1964; Dahlem, Waldfriedhof am Hüttenweg 1966; Lichtenrade, im Schulgarten an der Zescherstr. als Unkraut, leg. GERSTENBERGER 1963 (SCH.); Zehlendorf, Laehrpark 1964 (SCHWANDT); Zehlendorf, in Grünanlagen zwischen Seehof- und Mühlenstr. 1966 (SCH.).
- C. flexuosa* With.: KöW Klingspring am Tornow-See bei Teupitz 1962 (F.).
- Arabis hirsuta* (L.) Scop. subsp. *gerardii* (Bess.) Hartm. f.: Tr Wiesen vor Märk. Wilmersdorf 1922 (L.).

- Nasturtium microphyllum* Boenningh. ex Rchb.: Pr Lützlow, am Randowbruch 1953 (H. SCHMIDT). Fb Neuzelle, Sumpfwaldstelle hinter dem Schützenhaus und auf der Lawitzer Trift 1922 (L.).
- Rorippa prostata* (Berg.) Sch. et Thell.: Tr Neuer Graben, in Wasser- und Landform, 1927 (L.).
- Erysimum hieraciifolium* Jusl.: B Grunewald, Trümmerberg am Teufelssee 1963 (SCH.). Bz Brück, hinter dem Bahnhof 1936 (L.).
- **Sisymbrium irio* L.: B Spandau, Müllplatz bei den Egelpfuhlwiesen 1962; Grunewald, Trümmerberg am Teufelssee 1962 (SCH.); Lichtenberg, Nordseite des Stadtparks auf ehem. Bunkerberg 1958; Friedrichsfelde, Schuttkippe östl. Tierpark 1961 (SCHULTKA).
- **S. austriacum* Jacq. var. *acutangulum* (DC.) Koch: B Grunewald, Trümmerberg am Teufelssee 1962 (SCH.).
- Reseda luteola* L.: B Spandau, Müllplatz bei den Egelpfuhlwiesen 1962; Grunewald, Trümmerberg am Teufelssee 1962 (SCH.).
- Drosera* × *obovata* M. et K.: Rg Zwischenmoor zw. Glawke-See und Bikow-See bei Zechlinerhütte (KR.).
- Sedum villosum* L.: Fb Neuzelle, Sumpf auf der Schweineweide bei Lawitz 1932 (LADEMANN).
- S. rupestre* L.: B Charlottenburg, Angerburger Allee beim Glockenturmweg 1949 (S.); Wannsee, Pfaueninsel 1951, 1961, 1964 (MY., SU., BRAHE).
- Saxifraga tridactylites* L.: B Nikolassee, oberhalb der Autobahn nahe S-Bahnhof Nikolassee 1965—1967 (WA.); Buckow, Acker am Heroldweg 1965 (SCH.).
- **Rhodotypos scandens* (Thunb.) Mak. = *Rh. kerrioides* S. et Z.: B Lichtenrade, verwildert an der Bohnstedtstr. 1961. — Zierstrauch aus Japan. (SCH.)
- Rubus* L.: Das im folgenden verzeichnete Herbarmaterial (Herbar Lemke) wurde von HRUBY und z. T. von A. SCHUMACHER revidiert. Anordnung in alphabetischer Reihenfolge. (L.)
- R. carpinifolius* Weihe: Tr Ludwigsfelde auf beiden Seiten der Autobahn, mehrfach 1947, 1948, 1952 (L.).
- R. ambifarius* P. J. Müller: Tr Ludwigsfelde, an mehreren Stellen an der Autobahn 1948, 1949 (L.).
- R. caesius* L. × *R. villicaulis* Koehler: Tr Ludwigsfelde, Südböschung der Autobahn 1952 (L.).
- R. candicans* (Weihe) Focke: Tr Ludwigsfelde, vor der Brücke über die Eisenbahn 1948 (L.).
- R. hedyocarpus* (Focke) Hruby: P Kleinmachnow, Wegrand am Tümpel vor der Eigenherdschule vor der „Hasenfurche“ 1946 (L.).
- R. hemistemon* P. J. Müller: P am Weg nach Geltow 1942. Bz Brück, Kiefernwald nördl. der Neuen Wiesen 1934 (L.).
- R. nitidus* Weihe et Nees: Ra Grünauer Forst 1898 (HÜLSEN).
- R. pervagus* Sudre: Tr Ludwigsfelde, N-Seite der Autobahn nahe der Eisenbahn 1949 (L.).
- R. pyramidalis* Sudre: Tr Ludwigsfelde, N-Seite der Autobahn nahe der Eisenbahn 1949 (L.).
- R. radula* Weihe: P Kleinmachnow, Moorstelle am Teltowkanal 1926 (L.).
- R. serrulatus* Lindb.: Tr Ludwigsfelde, beiderseits der Autobahn nach Westen 1949, 1952 (L.).

- R. silvaticus* Weihe et Nees: Or Verlorenort bei Kremmen im Mischwald nach Döringsbrück zu 1942 (L.).
- R. sprengelii* Weihe: Tr Ludwigsfelde, Südböschung an der Autobahn westl. vom Ort 1952 (L.).
- R. suberectus* And.: Te Kappe bei Zehdenick, an der Schorfheide 1949 (H. SCHMIDT).
- R. sulcatiformis* Sudre: Bz Brück, Oberbusch, am Ostrand des Jg. 9 am Waldgraben 1936 (L.).
- R. vulgaris* Weihe et Nees: Tr Westufer des Kliestower Sees 1931 (L.).
- R. wettsteinii* Petrak: Pr Weggun, Wald nahe des Krebssees 1950 (H. SCHMIDT). B Schildow, SW-Rand des NSG 1942. P Kleinmachnow, „Hasenfurche“ am Tümpel vor der Eigenherdschule 1946. Tr Ludwigsfelde, Autobahn nahe Eisenbahnbrücke 1936. Bz Brück, NO-Ende des Linther Oberbusches 1936 (L.).
- **Potentilla fruticosa* L.: B Lichtenrade, 1963 Bahngelände an der Buckower Str. zw. den Gleisen (SCH.); Schöneberg, Jungpflanzen auf einer abgeräumten Trümmerfläche Motz- Ecke Martin-Luther-Str. 1964 (Su.).
- **P. recta* L.: B Bez. Kreuzberg, an der Alten Jakobstr. und Koch- Ecke Jerusalemer Str. 1964; Bez. Tiergarten, Südteil des Gr. Tiergartens 1966 (KUNICK); Schöneberg, Freiherr-vom-Stein-Str., Vorgarten 1966 (Su.); Dahlem, Königin-Luise-Str., im Rasen vor dem Bot. Museum 1961—1964 (D. MÜLLER); Lankwitz, Parkstreifen nahe Trippsteinstr. 1964 (SCHWANDT); Köpenick, Teufelssee/Müggelberge, unterhalb der Rodelstation 1959; Nikolassee, Palmzeile Ecke Matterhornstr., ein Ex. 1965; Nikolassee, am Bahndamm oberhalb des Schlachtensees 1965 (WA.); Wannsee, Pfaueninsel, Kavaliershauswiese 1964 (Su.).
- **P. intermedia* L.: B Bez. Tiergarten, nahe Lützowplatz 1953; Bez. Tiergarten, Lützow- Ecke Flottwellstr. 1965 (Su.); Bez. Tiergarten, auf dem Gelände der Großmarkthalle an der Beusselstr. 1957 (SCH.); Bez. Mitte, nahe Rathaus 1957 (SCHULTKA); Grunewald, Trümmerberg am Teufelssee 1965 (SCHWANDT); Schöneberg, am Kleistpark 1963 (Su.).
- Agrimonia procera* Wallr.: Te Schorfheide bei Kappe 1949 (H. SCHMIDT). Na Großer Graben bei der Kuhbrücke 1908 (BERGER). B Charlottenburg, Murrellental 1965 (MÜNDEL). Fw NSG „Beerenbusch“, Jg. 102 am Gebüschrand 1963 (F.).
- Alchemilla monticola* Opiz: B Tegel, Reiherwerder 1964 (SCH. u. Su.); Nikolassee, Rehewiese 1965 (WA.).
- Filipendula vulgaris* Moench: Pr Weggun, Straße nach Arendsee 1951 (H. SCHMIDT). P Bahndammböschung zw. d. Hauptbhf. und der Brücke über den Templiner See 1962 (F.).
- Rosa* L.: Das Material der im folgenden aufgeführten Rosenarten aus Sommerfeld (Lubsko) wurde 1920/21 von R. SCHULZ gesammelt und von E. SCHENK revidiert. (L.)
- R. omissa* Déségl.: Sommerfeld Hügel zw. Ofenfabrik und dem Bergschlößchen (L.).
- R. tomentosa* Sm.: Sommerfeld Hügel zw. Ofenfabrik und Bergschlößchen, Weinberge; Tonausstich der Ziegelei von Beerfelde (L.).
- R. rubiginosa* L.: Sommerfeld bei dem Dorfe Preicho (L.).
- R. agrestis* Savi: Sommerfeld im Orte an einem Gartenrand (L.).
- R. elliptica* Tausch: Sommerfeld Hügel zw. Ofenfabrik und dem Bergschlößchen (L.).

- Genista germanica* L.: Pr Weggun, an der Straße nach Arendsee 1951 (H. SCHMIDT).
- **Melilotus wolgicus* Poir.: B Grunewald, Trümmerberg am Teufelssee 1962. — Heimat: Südosteuropa. (SCH.)
- **M. indicus* (L.) All.: B Friedenau, unter Serradella auf dem Mittelstreifen der Rheinstr. 1966 (SCH.).
- Trifolium fragiferum* L.: B Lübars 1953 (SU.); Reinickendorf, Ausstiche bei Wilhelmsruh 1947; Spandau, am Kanal zw. Haselhorst und Tegeler See 1952 (STR.); Havel am Gr. Fenster 1948 (DE.); Mariendorf, im Volkspark 1964 (SCHWANDT); Wannsee, am Griebnitzsee bei der Hubertusbaude 1960 (WA.); Ostufer Seddinsee, leg. REIMERS (SCH.). Pr Warnitz, am Ober-Ucker-See 1955 (H. SCHMIDT).
- **T. tomentosum* L. var. *glabrescens* Post: B Lichterfelde, verschleppt in einem Vorgarten der Knesebeckstr., Ende August 1940 leg. H. BEGER als *Trifolium* spec. (Herbarium Bot. Museum Berlin-Dahlem). — Heimat: Mittelmeergebiet. (SCH.)
- **T. incarnatum* L.: B Wannsee, Königstr. 1955 (KOCH); Kladow, verwildert am Unkenpfuhl 1965 (SCH.).
- Vicia sylvatica* L.: Pr Parmen, am Bahndamm am „Kiecker“ 1951 (H. SCHMIDT).
- V. tenuifolia* Roth: Pr Parmen, Weg nach Arendsee 1951 (H. SCHMIDT).
- **V. grandiflora* Scop.: B Heiligensee, Wiesenrand 1958 (W. KRÜGER). P Ackerland bei Deetz 1966 (ADAM).
- **V. pannonica* Crantz: P Stahnsdorf, hinter der „Gasse“ im Sommergetreide 1945 (L.).
- **V. peregrina* L.: B Schmargendorf, trockene Wiese 1964, leg. SCHWANDT (SCH.).
- **Lathyrus tuberosus* L.: B Heiligensee, Feldweg zw. Dorf Schulzendorf und der Bahn 1963 (STR.); Siemensstadt, Südufer des Berlin-Spandauer Schiffahrts-Kanals nahe Rohrdamm (KOCH); Bez. Tiergarten, Südteil des Gr. Tiergartens 1965 (KUNICK); Lichtenberg, Stadtpark, auf ehem. Bunkerberg 1958; Grünau, am Adlergestell zw. Teltow-Kanal und Bahnhof 1959 (SCHULTKA); Lankwitz, Wiese im Gemeindepark 1963; Lichterfelde, Südufer des Teltow-Kanals zw. Eugen-Kleine-Brücke und Grenze (SCHWANDT).
- Geranium pratense* L.: Fr Gebüschrand zw. der Berliner Chaussee und den Prämer Bergen 1963 (F.). L Chausseerand nach Schlabendorf 1962 (F.).
- G. columbinum* L.: B Buckow, 1962 am Wegrand der Straße 48 (SCH.); Steglitz-Lichterfelde, Teltowkanal 1955 (FU-Exkursion).
- Radiola linoides* Roth: B Reinickendorf, Ausstiche bei Wilhelmsruh 1947 (STR.).
- **Mercurialis annua* L.: B Charlottenburg, Laubenkolonie in Westend 1963, leg. HIERONIMUS (SU.); Steglitz, Gartenanlagen auf dem Fichtenberg 1965 (U. HAMANN); Schöneberger Südgelände 1965; Friedenau unter Serradella auf dem Mittelstreifen der Rheinstr. 2 Pflanzen 1966 (SCH.). Zo Gärten im Ortsteil Weinberge (KR.).
- **Euphorbia virgata* W. et K.: B Lichterfelde, Bahndamm bei der Hildburghäuser Str. 1961; Marienfelde-Süd, an der Bahn 1963; Lichtenrade, Bahndamm an der Buckower Str. 1963 (SCH.); Niederschöneweide, Bhf. Schöneweide 1965 (HUDZIOK). — Der Formenkreis der *E. virgata* bedarf weiterer Untersuchungen; nicht immer ist eine eindeutige Abgrenzung gegenüber *E. esula* L. möglich. (SCH.)
- E. exigua* L.: T Äcker bei Deutsch-Bork 1962 (F.).

- **E. glareosa* M.B.: **Crossen** (Krosno) Rädnitz, am Mühlenberg 1940, leg. STRECH, det. MARKGRAF. — Heimat: Kaukasus. (L.).
- **E. marginata* Pursh: **B** Heiligensee, Heiligenseestr. Ecke Norddorfer Pfad 1960. Verwilderte Zierpflanze (Su.); Kreuzberg, Mehringplatz, abgeräumte Trümmerfläche 1963 (HEJNÝ).
- Callitriche stagnalis* Scop.: **Pr** Weggun, Graben am Torfloch 1951; Schulzensee (H.SCHMIDT). **Tr** Märk. Wilmersdorf, Wiesengraben mit *Ranunculus paucistamineus*, *Lemna trisulca*, *L. minor*, *Hottonia* etc. 1952 (L.).
- Empetrum nigrum* L.: **Rg** Birkenbruchwald am Kölpinsee bei Sellenwalde, ein mehrere qm großer Bestand, stets steril, aber sich vegetativ ausbreitend, mit *Ledum palustre* und *Osmunda regalis* (Kr.).
- **Hibiscus trionum* L.: **B** Steglitz, Steglitzer Damm in einem Garten, vermutlich aus Vogelfutter 1966 (HENNIG).
- **Impatiens glandulifera* Royle: **B** Lichtenberg, Wolfgangstr., auf geräumtem Kleingartengelände 1958 (SCHULTKA). **Rg** in Neuglobsow reichlich verwildert in Unkraut- und Saumgesellschaften der Dorfstraße, vereinzelt auch im Schilfröhricht des Gr. Dagow-Sees. **Sb** in großen Beständen an Gräben östl. des Sorgeteiches bei Guteborn (Kr.).
- Malva alcea* L.: **B** Gatow, am Seeburger Weg 1962; Grunewald, Trümmerberg am Teufelssee 1962 (SCH.). **Tr** auf dem wendischen Ringwall (L.).
- **M. moschata* L.: **B** Lichterfelde, Goerzallee 1964 (SCHWANDT).
- M. pusilla* Sm.: **B** Lichterfelde, Knesebeckstr., Rasenfläche am Bhf. Lichterfelde-West 1966 (WA.).
- **M. verticillata* L. var. *crispa* L.: **B** Schöneberg, Vorgarten in der Erfurter Str. 1963, 1966. Vermutlich Vogelfutterpflanze (Su.).
- **Abutilon theophrasti* Med.: **B** Buchholz, Schönerlinder Str., mehrere Ex. auf einem Rieselfeld 1961 (SCHULTKA).
- Hypericum humifusum* L.: **Ky** Stadtfurst, im Jg. 19 und 20, 1963 (F.). **B** Mariendorf, feuchtes Ackerland südl. der Britzer Str. 1962; Lichtenrade, bei der Bahn an der Buckower Str. 1963 (SCH.). **Ca** Gr. Mehßower Tannenbusch 1963 (F.). **Fi** NSG „Suden“ bei Gorden 1963 (F.).
- H. montanum* L.: **P** NSG „Mittelsee“ und „Mittelheide“ bei Lehnin 1963 (F.). **Gr** Himmelpfort bei Dannenwalde 1962 (F.).
- Elatine hydropiper* L. emend. Oeder: **L** Sandteich bei Drehna 1962 (F.).
- Helianthemum nummularium* (L.) Miller: **L** Trockenwiese am Fließ südöstl. Bornsdorf 1962 (F.).
- Viola stagnina* Kit.: **Pr** Weggun, am Bauernsee 1951 (H. SCHMIDT).
- V. pumila* Chaix: **Ra** Wiesen südl. Gülpe 1963 (WISNIEWSKI).
- V. hirta* L.: **Pr** Lützlow, N-Hang des Kimmberges 1955 (H. SCHMIDT).
- **Hippophae rhamnoides* L.: **Tr** Galgenberg, in alten Sandgruben in dichten Beständen 1928 (L.).
- Peplis portula* L.: **B** Mariendorf, an einem Feldtümpel zw. Wildspitzweg und Britzer Str. 1962 (SCH.).
- **Epilobium collinum* Gmel.: **B** Tiergarten, Ufermauer der Spree am Reichstag 1965 (SCH.); Schöneberg, Kufsteiner Str. Ecke Wexstr. 1964 leg. SUKOPP; Zehlendorf, bei Kohlhasenbrück auf Bahnschotter im Düppeler Forst 1965 (SCH.).
- E. adnatum* Griseb.: **D** Görsdorf im Schloßpark 1955 (SCHMATTORSCH).

- **Oenothera coronifera* Renner: **B** Tiergarten, Lützow- Ecke Flottwellstr. auf einem Trümmergrundstück 1965, det. H. SCHOLZ; Tiergarten, Trümmerfläche zw. Schelling-, Link- und Eichhornstr. mehrfach 1965, 1966 (ZACHARIAS); Schöneberg, auf Bahngelände an der Yorkstr. 1965; Schöneberg, auf Bahngelände an der Crellestr. nördl. der Langenscheidtstr. 1965; Marienfelde, am Bahndamm beim Lichtenrader Weg 1963 (SCH.).
- **O. erythrosepala* Borb.: **B** Wannsee, Pfaueninsel, beim Kavaliershause und auf den Terrassen in der Gärtnerei 1964; Lankwitz, Sondershauser Str. 1966, leg. SCHWANDT (SU.).
- Circaea alpina* L.: **Rg** Erlbruch am Kl. Bobero-See bei Schönborn (KR.). **Gu** am Oegelter Berg 1932 (LADEMANN). **Ca** Gr. Mehßower Tannenbusch 1963 (F.).
- C. lutetiana* L.: **B** Charlottenburg, Schloßpark Charlottenburg 1966 (SU.).
- Myriophyllum verticillatum* L.: **Bz** Brück, Graben auf den Neuen Wiesen nördl. der Stadt 1937 (L.). **Fb** Neuzelle, Gräben der Oderwiesen 1932 (LADEMANN).
- Sanicula europaea* L.: **Pr** Lützlow, im Zehnebecker Wald 1953 (H. SCHMIDT). **Fi** Sonnenwalde, Fasanerie am Forsthaus Brehnitz 1962 (F.).
- Eryngium planum* L.: **Eb** bei Kloster Chorin 1958 (Institutsexkursion des Inst. f. Spez. Bot. Jena). **P** Stahnsdorf, Brachecke an der Mühlenstr. 1939 (L.).
- Apium repens* (Jacq.) Lag.: **Pr** Warnitz, am Ober-Ucker-See 1955 (H. SCHMIDT). **P** Ferch, am Schwielowsee 1955 (L.).
- Silaum silaus* (L.) Sch. et Thell.: **Ge** Wiesen an der Kabellaae nördl. Altenklitsche 1966 (KR.). **B** Forst Oberspree, nahe der Birkenallee zw. Schöneiche und Woltersdorf 1966 (WEYMAR).
- Angelica archangelica* L.: **St** Woltersdorfer Schleuse, am Graben zum Kalksee 1942 (L.).
- Chimaphila umbellata* (L.) Barton: **Sp** südwestl. Schwarze Pumpe, Fußweg nahe der F 97, 1963 (SCHADE).
- Moneses uniflora* (L.) Alef.: **Neustrelitz** Serrahn, Jg. 101 am Weg nach Carpin (F.).
- Pyrola minor* L.: **B** Lichtenrade, am Kirchhainer Damm gegenüber Sanatorium Birkenhaag unter Gebüsch im Kiefernwald 1963 (SCH.).
- **Pieris floribunda* (Pursh) Benth. et Hook.: **Eb** Großes Postluch in Abt. 150 der Oberförsterei Finowtal 1957 (STÖCKER).
- Erica tetralix* L.: **Br** Weißes Fenn nördl. Mahrzahne, in der moliniareichen Randzone des Moores 1963; Mahrzahner Fenn 1963 (ULRICH). **Ra** Ebelgründer Moor im Birken-Kiefern-Bruch 1962. **Ca** Gr. Mehßower Tannenbusch 1963. **Fi** NSG „Suden“ bei Corden 1963 (F.). **Füw** nördl. von Dannenreich, an der Autobahn 1962 (GILBRECHT).
- **Lysimachia punctata* L.: **B** Nikolassee, zw. Avus und Kronprinzessinnenweg in der Nähe der alten Avusausfahrt 1967 (WA.); Lichtenrade, verwildert auf Schutt an der Bahnböschung nördl. des Bahnhofs 1957 (SCH.).
- Trientalis europaea* L.: **Rg** Abhänge am Rehluch nordwestl. Beerenbusch, eine kleine Gruppe von Exemplaren, die durch Kahlschlag und darauffolgende Aufforstung recht gelitten haben, 1963 (KR.). **Bz** NSG „Spring“ am Weg zwischen Jg. 30 und 38. Erster Fund der Art im Fläming 1963! (F.)
- Glaux maritima* L.: **Na** Wiesen südl. des Dichtower Dammes östl. der Eisenbahnlinie Nauen—Kremmen auf einer Salzwiese noch 1966 reichlich mit *Triglochin maritimum* und anderen Halophyten (KR.).

- **Buddleja davidii* Franchet: **B** Kreuzberg, am Schöneberger Hafen auf Schutt 1964 (SCH. u. SU.); Kreuzberg, ehem. Görlitzer Bhf. 1965 (SU.); Wilmersdorf, Wexstr. 1965, 1966 (SU.); Steglitz, Munsterdamm Ecke Steglitzer Damm 1966 (HENNIG).
- Centaurea minus* Moench: **Pr** Weggun, im Mückenloch 1951 (H. SCHMIDT). **Tr** Torfstich im Priedel vor der Schlucht 1928; Weg von Celle nach Lenzburg 1931 (L.).
- Gentiana pneumonanthe* L.: **Rg** am Rande der Kölpinsee-Wiesen westl. Sellenwalde in einem Junco-Molinietum reichlich (von hier schon von WINTER in VBVB 12: 23, 1870, gemeldet) (KR.). **B** Lübars 1956 (WANDEL); Forst Düppel, Altenhof 1951 (MY.). **P** Molinietum am Zernsee bei Golm 1963 (F.). **Tr** Wiesen südwestl. hinter dem Finkenberg 1951 (H. FRITSCH). **L** Wiese südöstl. von Bornsdorf 1962 (F.).
- Gentianella amarella* (L.) C. Boerner: **Pasewalk** Pfeifengraswiesen im Randowbruch nördl. Zerrenthin (KR.).
- **Cuscuta campestris* Yuncker: **B** Siemensstadt, Nonnendammallee gegenüber Ohmstr., auf *Chenopodium* 1960 (WERNICK); Gatow, Rieselfelder bei Karolinenhöhe 1964 (SCH.).
- Asperugo procumbens* L.: **B** Charlottenburg, auf dem Trümmerberg im Schloßpark unter Robinien 1966 (SCH. u. SU.). **P** am Horster Weg bei der Nuthebrücke 1963 (F.).
- Lappula myosotis* Moench: **B** Lichtenberg, Schuttablage am Betriebsbhf. Rummelsburg 1964 (VOBACH).
- Myosotis laxa* Lehm.: **D** Graben auf den Wiesen vor Schwebendorf 1954 (SCHMATTORSCH).
- M. hispida* Schlecht.: **B** Entgegen früheren Vermutungen zeigte sich in der neueren Zeit, daß die Art in Berlin auf trockenen Böschungen und Grasflächen recht verbreitet ist. Zahlreiche Fundmeldungen aus mehreren Bezirken liegen vor. (SCH.)
- M. sparsiflora* Mikan: **B** Wannsee, Pfaueninsel häufig 1963 (SU.); Wannsee, Volkspark Glienicke 1964 (KOCH).
- Nonea pulla* (L.) DC.: **Pr** Warnitz, am Bahnübergang nahe dem Bhf. 1955 (H. SCHMIDT). **B** Wuhlheide, Bahndamm südwestl. Bhf. Wuhlheide 1958 bis 1962 (SCHULTKA).
- Pulmonaria angustifolia* L.: **Te** Hang zum Fuhrsee 1949 (H. FRITSCH).
- **Symphytum* $\times$ *uplandicum* Nym.: **B** Marienfelde, am Diedersdorfer Weg 1963 (SCH.).
- **Verbena urticifolia* L.: **B** Grunewald, Trümmerberg am Teufelssee 1962. — Heimat: Mittelamerika. (SCH.)
- Teucrium scordium* L.: **Te** am Stadtsee 1949 (H. FRITSCH). **B** Havelufer südl. Lieper Bucht 1962 (SU.).
- T. scorodonia* L.: **Nr** Waldwegrand am Forsthaus Tornow, eingebürgert 1962 (F.).
- **Scutellaria altissima* L.: **B** Grunewald, Trümmerberg am Teufelssee 1962 (SCH.).
- Marrubium vulgare* L.: **B** Grunewald, Trümmerberg am Teufelssee 1962 (SCH.). **Bz** Straße hinter Neuendorf 1932 (L.). **J** Werder, Dorfaue 1922 (L.).
- Galeopsis ladanum* L.: **B** Spandau, Roggenfeld auf dem Gelände des Johannisstiftes 1962 (SCH.).
- G. speciosa* Mill.: **B** Lübars, im Röhricht 1962 (U. u. D. MÜLLER).

- **Stachys annua* L.: B Steglitz, in einem Vorgarten der Lauenburger Str. am Lauenburger Platz 1962 (SCH.).
- **Salvia nemorosa* L.: B Forst Düppel Jg. 88, Grasplatz an der Königstr. 1953 bis 1959 (KOCH).
- **Melissa officinalis* L.: B Grunewald, Trümmerberg am Teufelssee 1962 (SCH.).
- Mentha gentilis* L.: P verwildert in Stahnsdorf 1945. Tr Klietower See 1927. Bz Brück, Gebüsch an einem Garten 1932, wohl verwildert (L.).
- **Nicandra physaloides* (L.) Gaertn.: B Charlottenburg, Kurt-Schumacher-Damm südl. Hinkeldey-Brücke 1955 (SU.).
- **Solanum nitidibaccatum* Bitter: B Schöneberg, Schöneberger Südgelände 1963; Grunewald, Trümmerberg am Teufelssee 1962 (SCH.).
- **S. rostratum* Dunal: B Zehlendorf, Sachtlebenstr. Ecke Klein-Machnower Weg 1965 (ZACHARIAS).
- Verbascum phoeniceum* L.: B Bez. Mitte, Thälmannplatz, abgeräumte Trümmerfläche, zusammen mit *Corynephorus* und *Helichrysum* 1954 (SCHULTKA); Tempelhof, Marienhöhe, weißblühend 1966 (HENNIG); Lankwitz, Gemeindepark 1965 (SCHWANDT).
- V. *phlomoides* L.: B Diese bisher verkannte Art ist im Gebiet nicht selten. Bez. Kreuzberg, mehrfach auf Trümmerflächen; Schöneberg, Erfurter Str. unter Strauchpflanzungen 1966 (SU.); Marienfelde, Trümmerberg westl. Diedersdorfer Weg 1966 (SCH.).
- **Linaria genistifolia* (L.) Mill.: B Hermsdorf, Frohnauer Str., im Garten 1966 (WINDISCH).
- **Scrophularia vernalis* L.: B Wannsee, Pfaueninsel, im Alliaro-Chaerophylletum temuli bei der Schloßküche und östl. der Gärtnerei 1963, 1965. Auf der Insel bereits vor mehr als hundert Jahren von VOCKE gefunden, vgl. ASCHERSON 1859. (SU.)
- S. umbrosa* Dum. = *S. alata* Gilib.: P Kleinmachnow, Sumpf zw. den Karpfenteichen 1946 (L.).
- **Mimulus guttatus* DC.: Fehrbellin am Rhinufer verwildert 1963 (F.).
- Gratiola officinalis* L.: Ra Wiesen südl. Gülpe 1963 (WIŚNIEWSKI).
- Veronica longifolia* L.: B Spandau, Nordende des Pichelswerder (SCH.) und nahe Tiefwerder 1962 (D. MÜLLER); Havelufer nahe Moorlake 1953 (PIETSCH).
- V. *verna* L.: B Kladow, Brachland an der Sakrower Landstr. 1964; Kladow, Ritterfelddamm 1960; Forst Grunewald, Havelufer an der Lieper Bucht 1964 (SCH.).
- V. *prostrata* L.: B Grunewald, Südteil Pichelswerder 1966 (SCH. u. SU.); Grunewald, Havelufer an der Lieper Bucht 1964 (SCH.); Zehlendorf, Laerhpark 1965 (SU.); Wannsee, Volkspark Glienicke seit 1952 (KOCH); Köpenick, Müggelheimer Damm nordöstl. Chausseehaus 1960 (SCHULTKA); Rahnsdorf, an der Fürstenwalder Allee 1966 (WA.). P und Tr um Fresdorf sehr häufig in mesophilen Sandtrockenrasen (*Armerion elongatae*), u. a. auf dem Dorfanger; an der Chaussee nach Wildenbruch; Chaussee nach Stücken; Weg nach Kähnsdorf; Stücken, am Weg nach Blankensee; Wildenbruch, am Weg nach Kunersdorf (KR.).
- *V. *teucrium* L.: B Rudow, Wegrand am Röthepfuhl 1962, aus Gärten verwildert (D. MÜLLER).
- Digitalis grandiflora* Miller: Fw Krangelsberge zw. Stahnsdorf u. Dannenreich 1962 (GILBRECHT).

- Melampyrum arvense* L.: Pr Parmen, Wald am N-Ende des „Kiecker“ 1951 (H. SCHMIDT).
- M. pratense* L. subsp. *angustifrons* Borb.: Tr Ludwigsfelde, Kieferngehölz vor dem Werk 1953, det. RONNIGER (L.).
- Lathraea squamaria* L.: Pr Arendsee, Park der Zentralschule und am Schloßpark 1952; Gramzow, im Zehnebecker Wald 1953. Bz Brück, im Schloßbusch 1932 (L.); Wiesenburger Park 1963 (SCHMEJA).
- Orobanche arenaria* Borkh.: Freiw auf dem Ruinenberg 1907 (BERGER).
- Utricularia neglecta* Lehm.: P Wublitz-Ende bei Marquardt 1963 (KONCZAK).
- U. minor* L.: L Hochmoor zw. Wannichen und Stiebsdorf 1963 (F.).
- U. intermedia* Hayne: Lychen Fürstenwiese bei Tangersdorf 1964, reichlich blühend (CASPER). Rg Moor nordwestl. Feldgrieben (KR.).
- Plantago indica* L.: L Bahnhof Waldrehna 1962 (F.). Crossen (Krosno) Rädnitz-Bhf. am Rand des Mühlenberges 1944 (STRECH). Tr Bahnstrecke am Bohldamm und nördl. vom Klietower See 1930 (L.).
- Sherardia arvensis* L.: Pr Lützelow, Brachland vor dem Zehnebecker Wald 1953 (H. SCHMIDT). T Äcker bei Deutsch-Bork 1962 (F.).
- Galium odoratum* (L.) Scop.: B Nikolassee, Jochen-Klepper-Weg, in einem Waldrest 1965 (WA.).
- Asperula tinctoria* L.: Fr Prämer Berge, vereinzelt noch vorhanden 1963 (F.).
- A. cynanchica* L.: Ra Mühlenberg in Schollene 1966 (KR.); Waldweg nördl. vom Ebelgründer Moor 1962 (F.).
- **Sambucus racemosa* L.: Fi NSG „Grünhaus“ 1963 (F.); NSG „Suden“ bei Gorden 1963 (F.). P Stahnsdorf, Platz vor der Machnower Schleuse 1942 (L.). Tr Hang vom Löwendorfer Berg in den Priesel 1930 (L.); Ludwigsfelde, westl. Bhf. Birkengrund-Süd 1952 (L.).
- Linnaea borealis* L.: Co Kiefernwald nördl. der Stadt 1951 (K. HERSCHEL).
- Adoxa moschatellina* L.: Pr Parmen, im Kiecker 1951; Gramzow, Zehnebecker Forst 1953. Te Boitzenburg, im Erlenbruch 1950 (H. SCHMIDT). B Die Mehrzahl der Fundorte liegt in Parkanlagen: Tegel, Scharfenberg; Buch, Schloßpark; Wedding, Volkspark Rehberge; Charlottenburg, Lietzenseepark; Charlottenburg, Brixplatz; Dahlem, Park im „Schwarzen Grund“; Dahlem, Im Dol; Zehlendorf, Park an der Fischerhüttenstr.; Lankwitz, Gemeindepark. Beobachter: AFFELD, E. SCHMIDT, SCH., SCHUBERT, SCH.-M., SCHWANDT, SU., WA. (SU.). Fundorte außerhalb von Parkanlagen: Buch, Bucher Heide nördl. des Bogensees 1956 (ME.); Buch, zw. 1. und 2. Karpfenteich 1959 (WANDEL); Köpenick, Pferdebusch 1949, 1959 (SCHLÜTER, VOBACH).
- Valerianella dentata* (L.) Poll.: T Äcker bei Deutsch-Bork 1962 (F.).
- Dipsacus silvester* Huds.: B Buch, südl. der neuen Bahn 1955 (SU.).
- Valeriana collina* Wallr.: B Forst Oberspree, an der Birkenallee zw. Schöneiche und Woltersdorf 1953—1966 (WEYMAR).
- V. procurrens* Wallr.: Te Kappe, Bruch an der Schorfheide 1949 (H. SCHMIDT). Tr Wiesen nördl. von Märk.-Wilmsdorf 1953 (L.).
- Scabiosa columbaria* L.: Pa Caputher Heuweg, Jg. 124, 1963 (KONCZAK).
- **Bryonia alba* L.: Pr Weggun, Zäune im Dorf 1950 (H. SCHMIDT). B Weit seltener als *B. dioica*. Spandau, Götzelstr. 1961 (SU.); Tiefwerder, Jürgengraben 1957 (WERNICK); Lübars, östl. Ortsausgang 1955, 1963 (SU., SCH.); Lankwitz, Gemeindepark 1965 (SCHWANDT, SU.); Zehlendorf, Hafen nahe Goerzallee 1958 (SCH.); Mahlsdorf-Süd, Waldpromenade West; Mahlsdorf-

- Süd, Bergedorfer Str.; nahe Bhf. Hirschgarten (VOBACH); Gosen, Dorfrand 1960 (Su.). P Stahnsdorf, an einer Gartenhecke 1926. Tr Thyrow, Waldrand am Graben der Chausseebrücke nach Märk.-Wilmsdorf 1953. J Mauern am Südhag 1913 (L.).
- Campanula cervicaria* L.: Pr Fürstenwerder, an der Chaussee nach Feldberg 1952 (H. SCHMIDT).
- C. glomerata* L.: Pr Lützlow, Zehnebecker Wald 1953 (H. SCHMIDT). L Chausseerand nach Schlabendorf, 2 km südöstl. Luckau 1962 (F.).
- C. bononiensis* L.: Eb Hang am Paarsteiner See 1958 (Institutsexkursion) (L.).
- C. persicifolia* L.: Pr Weggun, Westufer des Krebssees u. am Schulensee 1950. Te Kappe, Wiesenrand vor der Schorfheide 1949 (H. SCHMIDT).
- Phyteuma nigrum* F. W. Schmidt: B Lankwitz, Wiese im Gemeindepark 1964 (SCHWANDT).
- **Aster salignus* Willd.: Crossen (Krosno) bei Bindow an der Oder 1944 (STRECH). P im Machnower Busch 1940 (L.).
- **Anaphalis margaritacea* (L.) Benth. et Hook. f. s. l.: B Kreuzberg, abgeräumte Trümmerfläche Lobeck- Ecke Ritterstr. in *Poa compressa*-Ges. 1964, det. WAGENITZ (Su.).
- Inula salicina* L.: B Britz, Rudower Wiesen 1927 (H. KRÜGER).
- Pulicaria dysenterica* (L.) Bernh.: P Hochstaudenflur nahe der Autobahn bei Deutsch-Bork (KR.).
- P. vulgaris* Gaertn.: B Lichtenrade, bei der Lehne-Siedlung an der Bohnstedtstr., leg. GERSTENBERGER 1963 (SCH.).
- **Iva xanthiifolia* Nutt.: B Grunewald, Trümmerberg am Teufelssee 1962 (SCH.).
- **Ambrosia artemisiifolia* L.: B Bez. Kreuzberg, Planufer Ecke Wilmsstr. 1964; Schöneberg, zw. Bahngelände und Friedhof an der Eisackstr. 1965 (SCH. u. Su.); Tiergarten, Kurfürstenstr. 1964; Lankwitz, Gemeindepark 1964, det. WAGENITZ (SCHWANDT).
- **A. psilostachya* DC.: Bz Brück, wüster Platz östl. der Eisenbahnstr. 1936 (L.); B Marienfelde, Lichtenrader Weg am Eingang zum Gutspark 1963, 1966 (SCH.-M., U. und D. MÜLLER); Tiergarten, Kurfürstenstr. 1965 (SCHWANDT).
- **Xanthium strumarium* L.: Bz Linthe bei Brück, Gestrüpp im Dorf bei der Quelle 1933 (L.).
- **X. albinum* (Widder) Scholz: Or Hennigsdorf, Havelwiesen 1963 (FRITSCH). P Stahnsdorf, erstmalig in einem Garten 1944 (L.). Tr Ludwigsfelde in der Werksiedlung 1952 (L.).
- **X. spinosum* L.: B Kreuzberg, geplante Fläche des Görlitzer Bhf., eine Pflanze 1965 (ZACHARIAS).
- **Rudbeckia hirta* L.: B Bez. Tiergarten, Südteil des Gr. Tiergartens 1966 (KUNICK); Grunewald, auf Rasenfläche der Ski-Piste des Trümmerbergs am Teufelssee 1966 (SCH.).
- **R. laciniata* L.: Ca Teichgelände bei Buchwäldchen (KR.).
- **Guizotia abyssinica* (L.) Cass.: B Spandau, Müllplatz Egelpfuhlwiesen 1962 (SCH.); Schöneberg, Fritz-Elsas-Str., Vorgarten 1965; Schöneberg, Freiherr-vom-Stein-Str., Vorgarten 1966 (Su.).
- **Bidens connata* Mühlb.: P Stahnsdorf, Nordrand des Vorderen Karpfenteiches am Erlengebüsch mit *B. tripartitus* 1926 (L.).
- **B. connata* Mühlb. var. *anomala* Farwell: B Wannsee, Nordufer des Griebnitzsees 1962 (vgl. WAGENITZ in HEGI, Illustrierte Flora von Mitteleuropa 6, 2. Aufl. München 1965). Die nichtklettende Form mit aufwärtsgerichteten

- Borsten an den Fruchtgrannen wurde auch in den folgenden Jahren an derselben Stelle beobachtet (SCH.); Forst Grunewald, am Pechsee 1966 (WA.).
- **Galinsoga ciliata* (Raf.) Blake: Pr Lützlow, Gartenunkraut 1933 (L.). Gu 1963 schon ziemlich häufig in Schutt- und Ackerunkrautgesellschaften der Stadt und Umgebung (KR.).
- Anthemis tinctoria* L.: Od Hang zum Teich von Brodowin 1958 (Institutsexkursion) (L.). B Schöneberg, Raetherstr., Strauchpflanzung 1966 (Su.); Lankwitz, Malteserstr. (SCHWANDT).
- A. ruthenica* M.B.: Nr Chausseeböschung am Bahnhof Altruppin 1962 (F.). B Staaken, Hahneberg, Roggenfeld in der Nähe der Müllkippe 1965 (WA.). St Rüdersdorf, am alten Bruch 1942 (L.). D Sandgrube nördl. von Gebersdorf 1951 (E. PATZKE).
- A. cotula* L.: B Gatow, Acker westl. des Dorfes 1959 (HARTMANN); Wannsee, Pfaueninsel 1964 (Su.).
- **Achillea filipendulina* Lam. = *A. eupatorium* M.B.: B Die in VBVB 102 (1965): 38, irrtümlich als *Chrysanthemum balsamita* L. bezeichnete Pflanze gehört zu dieser Art. — Verwilderte Zierpflanze aus dem Orient. (SCH.)
- **Chrysanthemum balsamita* L.: B Die Angabe in VBVB 102 (1965): 38 ist zu streichen (s. o.). (SCH.)
- Chr. segetum* L.: B Grunewald, Trümmerberg am Teufelssee 1961 (SCH.). Tr Ludwigsfelde, Bahnstrecke bei Birkengrund 1951 (L.).
- **Artemisia annua* L.: B Grunewald, Trümmerberg am Teufelssee 1963 (SCH.); Schöneberg, Martin-Luther-Str. nahe Innsbrucker Platz 1964 (Su.).
- Arnica montana* L.: Fr Prämer Berge 1963 (F.).
- Senecio tubicaulis* Mansf.: Rg Stechlinsee, eine Herde am Einfluß des Atomkraftwerk-Kanals; vereinzelt am 1962 neu ausgebauten „Aldrovanda-Graben“ zw. Zeuten und Mehltitz-See (KR.). Eb Paarsteiner See 1958 (Institutsexkursion) (L.). — Über die neuerliche Ausbreitung des Moorkreuzkrautes in Nordwestdeutschland vgl. die verschiedenen Mitteilungen von F. RUNGE in Natur und Heimat (Münster) ab 1960; letzte Mitteilung mit neuen Fundortsangaben aus dem Gebiet der mittleren Elbe in Natur und Heimat 25 (1965): 29—32. (SCH.)
- S. paludosus* L.: Ra Milow bei Premnitz, an der Stremme 1963 (KONCZAK).
- S. aquaticus* Huds.: B Spandau, Sumpfwiese bei Pichelswerder 1962 (SCH.). P Wiesen am Zernsee bei Golm 1963 (F.).
- S. erraticus* subsp. *barbareaefolius* (Wimm. et Grab.) Beger: Crossen (Krosno) an der Oder bei Pollenzig 1931 (LADEMANN).
- S. silvaticus* L. × *S. viscosus* L.: Tr Ludwigsfelde, wüster Platz hinter dem Kiefernbestand an der Potsdamer Str. 1949; Wäldchen beim Bhf. Birkengrund-Süd 1949 (L.).
- **Arctotheca calendulacea* (R.Br.) Lewin = *Cryptostemma calendula* (L.) Druce: B Friedenau, Rosetten unter Serradella auf dem Mittelstreifen der Rheinstraße 1966 (SCH.).
- Arctium* × *nothum* (Ruhmer) Weiss = *A. lappa* L. × *A. minus* (Hill) Bernh.: B Buckow, zwischen den Eltern am Eichenpfuhl 1962. — Die hybridogene Zwischenart ist im Gebiet von Berlin weit verbreitet. (SCH.)
- **Silybum marianum* (L.) Gaertn.: B Lichtenberg, Scheffelstr., in einer Gärtnerei auf Kompost 1958 (SCHULTKA); Lankwitz, Malteser- Ecke Belßstr. auf einem Ruderalplatz 1965 (SCHWANDT).

- Onopordum acanthium* L.: B Wittenau, bei Kolonie Rathenow 1962; Grunewald, Trümmerberg am Teufelssee 1960, 1962 (SCH.); Bez. Kreuzberg, Trümmer an der Alten Jakobstr. 1963 (HEJNÝ); Kladow, Krampnitzer Weg 1960 (SU.).
- Centaurea jacea* L. × *C. stoebe* L.: Tr Glau, an einer Stelle am Weg zum Priedel 1929, später nicht mehr (L.).
- **C. diluta* Ait.: B Spandau, Müllplatz bei den Egelpfuhlwiesen 1962, det. WAGENITZ (SCH.).
- Arnoseris minima* (L.) Schweigg. et Koerte: Te Kappe, Acker 1949 (H. SCHMIDT). Tr Löwendorfer Berg vor der Schlucht in den Priedel mit *Entyloma* 1927; Christinendorf, Acker 1946 (L.). P bei Groß Kreutz und Beetz auf Ackerland 1966 (ADAM).
- Picris hieracioides* L.: B Schöneberg, auf Schutt am Schöneberger Hafen 1964 (SCH.). St Rüdersdorf verbreitet 1941 (L.).
- **P. echinoides* L.: B Gatow, Feldrand 1964 (SCHWANDT).
- Scorzonera humilis* L.: P Caputher Heuweg nahe der Engelsquelle, Jg. 119, 20 Expl. 1962 (F.).
- **S. hispanica* L.: B Heiligensee, Baumberge 1955 (BERGER-LANDEFELDT); Wittenau, Müllplatz bei der Kolonie Bürgersruh 1962 (SCH.).
- Sonchus paluster* L.: B Heiligensee, Nordende des Nieder-Neuendorfer Sees 1965 (SU.). P Havelufer bei Baumgartenbrück; rechtes Havelufer an der Fährstelle bei Ketzin 1963 (F.); Nattwerder auf beiden Ufern der Wublitz 1963 (KURTH).
- **Crepis setosa* Hall. f.: B Kreuzberg, in Rasensaat Ritter- Ecke Alte Jakobstr. 1964 (SCH. u. SU.).
- Hieracium* L.: Die Bestimmungen der von Herrn LEMKE übermittelten Artnamen sind von ZAHN, SCHACK und später HUNDSDORFER revidiert (Sammeler: LEMKE, STRECH, LADEMANN). (L.)
- H. auricula* L.: L Sumpfwiese südöstl. Bornsdorf 1962 (F.).
- H. caespitosum* Dum.: Fb Neuzelle Oderwiesen 1922 (L.). B Tempelhof, unter Gebüsch auf dem Friedhof westl. der Gottlieb-Dunkel-Str. 1965 (SCH.).
- H. cymosum* L.: Crossen (Krosno) Rädnitz-Bhf. Hang bei Goskar a. d. Oder 1943 (STRECH). Fb Neuzelle, Diehloer Berge 1932 (LADEMANN).
- H. piloselloides* Vill.: B Tiergarten, Trümmerfläche zw. Potsdamer und Linkstr. 1966; Kreuzberg, Trümmerfläche an der Köthener Str. nördl. Bernburger Str. massenhaft 1966, 1967, det. WAGENITZ (ZACHARIAS). St Rüdersdorf, Halde am Bruch 1925; am Kalkgraben 1942 (L.).
- H. baubini* Schult.: B Dahlem, Gelände des Preuß. Staatsarchivs in der Archivstraße 1966, det. H. SCHOLZ (ZACHARIAS); Lichtenrade, Bahngelände an der Schillerstr. 1963 (SCH.).
- H. laschii* (Schultz) Zahn.: Crossen (Krosno) Rädnitz-Bhf., Lilienwerder 1940 (STRECH).
- H. caesium* Fr.: St Rüdersdorf, Weg am Kalkgraben 1942 (L.).
- H. levicaule* Jord.: P Hänge bei Geltow 1942. St Rüdersdorf, Heinitzsee 1942 (L.).
- H. racemosum* W. et K.: Kremmen Wald am Weg von Schwante nach Hohenbruch 1942 (L.). B Grunewald, nördl. vom Schlachtensee 1966 (WA.).