












TIEFE (CM)

STRATIGRAPHIE

ABSCHNITTE NACH FIRBAS

JUNIPERUS
CORYLUS
EMW
BETULA
PINUS

SALIX
HIPPOPHAE
EPHEDRA
DISTACHYA-TYP, E. FRAG-T, LARIX
POPULUS
QUERCUS
ULMUS
TILIA
FRAXINUS
ALNUS
HEDERA
VISCUM, ILEX
FRANGULA, RHAMNUS CATHARTICA
VIBURNUM, CORNUS SANGUINEA
PICEA, ABIES
FAGUS, CARPINUS
PINUS-SPÖ
BP-SUMME EXCL. CORYLUS
EMW INCL. FAGUS, CARPINUS
SONSTIGE BP INCL. SALIX
STRÄUCHER
SONSTIGE NBP INCL. ERICALES,
GRAMINEAE,
CYPERACEAE
PTERIDOPHYTA
HYGRO-, HELOPHYTEN
HELOPHYTEN
GES-SUMME EXCL. HYDROPHYTEN
ARTEMISIA
RUMEX ACETOSA-TYP
PLANTAGO MAJOR/MEDIA, P. LANC., P. SPEC
CHENOPODIACEAE
HELIANTHEMUM
POLYGONUM AVICULARE-T, P. BISTORTA-T
GYPSOPHILA, POLEMONIUM
XANTHIUM, CENTAUREA SCABIOSA-TYP
SANGUISORBA OFFICINALIS, S. MINOR
CALLUNA
EMPETRUM/LEDUM
ERICACEAE p.p. INDET., ARCTOSTAPHYLOS
POTENTILLA-TYP
GEUM-TYP/DRYAS
ROSACEAE p.p. INDET.
MELAMPYRUM, SCROPHULARIACEAE p.p.
TUBULIFLOREAE p.p.
ACHILLEA-TYP
CIRSIUM-TYP
LIGULIFLOREAE
DIANTHUS-T, CERASTIUM-T, SPERGUL-T
LYCHNIS-T, CARYOPHYLLACEAE p.p.
RANUNCULACEAE p.p.
RANUNCULUS ACRI-S-T, ANEMONE-T
UMBELLIFERAE p.p., BUPLEUR/PLEUROSP
LABIATAE p.p., STACHYS-TYP
RUBIACEAE
EPILOBIUM
CRUCIFERAE, CAMPANULACEAE
FABACEAE p.p., ONOBRYSIS-T, VICIA-T, LOTUS
PARNASSIA, PEDICULARIS PALUSTRIS-TYP
THALICTRUM
SUCCISA, VALERIANA, LYSIMACHIA
FILIPENDULA
URTICA
CANNABIS/HUMULUS
EURUMEX-TYP, CALYSTEGIA
GRAMINEAE p.p.
„CEREALIA“-TYP
CYPERACEAE p.p.
CLADIUM, SCIRPUS-TYP
TYPHA ANGUSTIFOLIA
TYPHA LATIFOLIA-TYP
SPARGANIUM, POLYGONUM AMPHIBIUM
CALTHA-TYP, MENYANTHES
Equisetum
POLYPODIACEAE p.p.
THELYPTERIS PALUSTRIS
PTERIDIUM
BOTRYCHIUM, OPHIOGLOSSUM
SELAGINELLA, SELAGINOIDES
LYCOPODIUM ALPINUM-TYP, L. ANNOTINUM
VARIA
INDETERMINATA
NYMPHAEA
NUPHAR
EUPOTAMOGETON-TYP
BATRACHIUM-TYP
MYRIOPHYLLUM SPIC/VERT, HIPPURIS
SPHAGNUM
PRAQUARTÄRER POLLEN
HYSTRICHOSPHAERIDAE
POLYPODIACEAE-ANULI
NYMPHAEAC-GEWEBE
CERATOPHYLLUM-HAARE



● Staubblätter
○ Fruchtblätter
pro 25 Blüten







Diagramm 2: Häufigkeitsverteilung der Staub- und Fruchtblattzahlen innerhalb der untersuchten Populationen von *Ranunculus ficaria* L.





Inhaltsverzeichnis

ZACHARIAS, F.:	Beiträge zur Ökologie von <i>Chenopodium botrys</i> L. VII Keimung, Intraspezifische Konkurrenz und Phänologie.	1
BRANDE, A.:	Pollenanalytische Untersuchungen im Spätglazial und frühen Postglazial Berlins.	21
KÜNZEL, R.:	<i>Ranunculus ficaria</i> L. (Ranunculaceae) in Berlin Zur Karyologie und Morphologie einer kritischen Sippe.	73

Die Abb. 4) (BRANDE) ist bei Seite 29 einzulegen
5) " ist bei Seite 31 einzulegen
10) (KÜNZEL) ist bei Seite 100 einzulegen