





Legende

Schwimblatt- und Laichkraut-Gesellschaft

Myriophyllo-Nupharetum (luteae)

Röhrichte und Großseggenrieder

Schoenoplecto-Phragmitetum

Glycerietum maximae

Phragmites australis-Bestand

Caricetum paniculatae

Caricetum acutiformis

Calamagrostis canescens-Bestand

Phalaridetum arundinaceae

Grünlandgesellschaften

Angelico-Cirsietum oleracei

Scirpetum sylvatici

Caricetum distichae

Juncus subnodulosus-Gesellschaft

Carex cespitosa-Gesellschaft

Staudenfluren

Filipendulo-Geranietum palustris

Agropyron repens-Urtica dioica-Bestand

Zwischenmoorgesellschaften

Carex rostrata-Gesellschaft

Caricetum appropinquatae

Carex lasiocarpa-Bestand

Bruchwälder und Grauweiden-Gebüsche

Carici elongatae-Alnetum medioeuropaeum

Salicetum cinereae

Betula pubescens-Wald

Wasserfläche

DAS BOLLWIN-TAL IN DER SCHORFHEIDE

VEGETATION

(IM ORIGINAL LIEGT DIE KARTE FARBIG
UND BIS ZUR SUBASSOZIATIONSEBENE
DIFFERENZIIERT IM MAßSTAB 1: 5000 VOR
(MIDDELSCHULTE 1992))

A. MIDDELSCHULTE