





Areal von *Phragmites australis*
 schraffierte Bereiche: Deckung > 5 % (Phragmites-Ausbildung)

Vegetation des offenen Wassers

Y Filzarmleuchteralgen-Grundrasen

F F Brunnenmoos-Gesellschaft

○ Schwimmplanzenbestände

Torfmoos-Seggenlede

||| Torfmoos-Schlammseggenried

||| Torfmoos-Seggen-Wollgrasried, typische Variante

||| Torfmoos-Seggen-Wollgrasried, Eriophorum vaginatum-Variante

||| Torfmoos-Seggen-Wollgrasried, Pinus-Phase

||| Torfmoos-Flatterbinsenried, typische Untergesellschaft

||| Torfmoos-Flatterbinsenried, Thelypteris-Untergesellschaft

||| Torfmoos-Flatterbinsenried, Carex elata-Phase

Großseggenlede

•• Zungenhahnenfuß-Großseggenried

•• Graslaichkraut-Steißseggenried, typische Variante

•• Graslaichkraut-Steißseggenried, Hydrocharis-Variante

•• Torfmoos-Steißseggenried, typische Variante

•• Torfmoos-Steißseggenried, Eleocharis mamillata-Variante

•• Torfmoos-Steißseggenried, Calamagrostis canescens-Phase

•• Schierlings-Scheinzypersseggenried, Carex paniculata-Ausbildung

•• Carex acutiformis-Calamagrostis epigejos-Bestände

Schilfröhrichte

== Armleuchteralgen-Schilfröhricht

||| Torfmoos-Schilfröhricht

||| Nachschatten-Schilfröhricht

Waldgesellschaften

•• Torfmoos-Birken-Erlenwald

1 - 4 Grundwassermeßpunkte

Vegetationskarte der Meelake

Stand 1991, Bearbeiter: Tiemo Timmermann