

**Fundorte höherer Pflanzen im Kreise Luckau/Finsterwalde,
die bei Rabenhorst 1839, Taubert 1886 und Bohnstedt 1889
nicht genannt sind
Sammelergebnisse 1952 bis 1957**

Von W. Klix

Lycopodium annotinum L. und *L. complanatum* L. subsp. *anceps* (Wallr.) Aschers.: Crinitz, eine etwa 3 m tiefe ehem. Kalkgrube nördl. Kl.-Bahren durcheinander völlig bekleidend (mit Sporenträgern).

Lycopodium inundatum L.: Lugau: Steingrubenteich.

Osmunda regalis L.: Doberlug: Südl. Forsth. Forst; Tanneberg: Nördl. Kl. Elster mit *Dryopteris thelypteris*; Sonnewalde: Forsthaus Stockhaus (etwa 15 Expl.) und Eichenlinie; Gahro: Rutsteich; Beesdau: Südl. Obermühle; Bornsdorf: Nördl. Mosesberg mit *Dryopteris thelypteris*; Gr.-Mehßow: Am Rande des Tannenbusches.

Blechnum spicant (L.) Roth: Gr.-Mehßower Tannenbusch 1500 Expl. gezählt; Crinitz: Weg nach Bergen rechts unter *Pinus rigida*; Gahro: Fließ am neuen Pumpwerk; Weißack: Ehem. Papiermühle. Sonst vereinzelt.

Asplenium ruta-muraria L.: Finsterwalde: Hauswand am Kindergarten in der Wilh.-Liebknecht-Str.

Dryopteris linnaeana Christ.: Drehna, Jagen 103 spärlich.

Dryopteris phegopteris (L.) Christ.: Gr.-Mehßow: Nähe Erlenwald am Tannenbusch.

Polypodium vulgare L.: Stiebsdorf: In Rabattengräben westl. der Kiesgrube zahlr.; Crinitz: Waldrand am Kastanienweg zahlr.

Scolochloa festucacea (Willd.) Link.: Drehna: Nähe Abfluß vom Ziegelteich (ARNDT, KLIX).

Melica nutans L.: Drehna: An den Krummbrückenteichen; Weißack: Wiesen nach Trebbinchen und nördl. Mosesberg; Crinitz: östl. Bahndamm.

Aira praecox L.: Babben: Kalkgruben hart südl. Ort (BEHR u. a.).

Scirpus maritimus L.: Drehna: Hellerteich unweit Schloß.

Carex silvatica L.: Weißack: Ehem. Tiergarten, von TAUBERT und BOHNSTEDT gemeldet, heute spärlich.

Calla palustris L.: Weißack: Ehem. Papiermühle zahlr., Gr. Torfstich.

Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid.: Drehna: Zufluß zum Ziegelteich.

Juncus macer S. F. Gray: Drehna: Fußsteig im Wald am Sandteich.

Luzula luzuloides (Lam.) Dandy et Wilmott: Babben: Weg nach Rehain, unweit des Forsthauses. Wahrscheinlich aus dem Park in Drehna verschleppt.

Convallaria majalis L.: Sonnewalde: Tiergarten bei Kl.-Kraußnigk (breitblättrige Form); Rochauer Heide: Nähe ehem. Bhf. Rochau.

Paris quadrifolia L.: Crinitz: Pechwiese mit *Orchis maculata*, beide zahlreich.

Platanthera bifolia (L.) Rich.: Waldrand Chaussee Crinitz—Drehna.

Orchis maculata L.: Drößigk: Wiese (Besitzer Mittag) nach Fischwasser, auch weißblühend, mit *Arnica montana*, *Pedicularis silvatica* und *Antennaria dioica* (ARNDT, KLIX).

Myrica gale L.: Crinitz: Einige Sträucher unmittelbar am Ort, an Bahn und östl. Niederhof (ehem. Teichränder).

Quercus petraea (Matt.) Liebl. var. *mespilifolia* (Wallr.): Crinitz: Nähe Bahndamm nach Gahro zu, wild als kleiner Strauch, verpflanzt in den Garten des Försters, hier kräftig emporgeschossen.

Phytolacca americana L.: Waldrand zw. Drehnaer Weinberg u. Stiebsdorf, 1955 ausgerottet.

Montia fontana L. s. lat. subsp. *verna* Neck.: Drehna: Lintteich beim Zigelteich (BEHR, MILITZER u. a.).

Myosurus minimus L.: Drehna: Lintteich, 0,5 ha völlig bedeckend (BEHR, MILITZER u. a.).

Ranunculus arvensis L.: Drehna: Weinberg (BEHR, KRAUSCH u. a.).

Ranunculus languinosus L.: Sonnewalde: Friedersdorfer Tiergarten (MILITZER).

Parnassia palustris L.: Drehna: Försterwiese südl. Sandteich, sparsam.

Potentilla intermedia L.: Crinitz: Chausseerand nach Drehna.

Sanguisorba officinalis L.: Crinitz: 2 Expl. am Abflußgraben des Röhreiches (Volksbad).

Filipendula hexapetala Gil.: Bergen: Trockene Wiese am Moor zahlr.

Ulex europaeus L.: Crinitz: 1 Expl. Kiefern Schonung nach Bergen; 5 Expl. Waldrand am Weißen Berge am Tannenbusch Gr.-Mehßow. Frieren bei strengem Frost stark zurück.

Astragalus glycyphyllus L.: Crinitz: Kalkgruben von Kl. Bahren bis Kalkberge nördl. Rehain zahlreich; Chaussee Crinitz—Drehna.

Coronilla varia L.: Gollmitz: Nähe Bhf. am Weg nach Settinchen spärlich.

Vicia cassubica L.: Crinitz: Kalkgruben nördl. Kl. Bahren; Weißack: Chausseeböschung bei den Kalkgruben; Rehain: Blockstelle Rehain südl. Bahn zahlr.; Rochauer Heide: Chausseerand.

Lathyrus montanus Bernh.: Babben: Traubeneichenwald westl. Pirschhütte spärlich; Weißack: Chausseerand nach Walddrehna Nähe Kalkgruben.

Lathyrus silvester L.: Crinitz: Kalkgruben hfg.

Lathyrus tuberosus L.: Drehna: Weinberg (von der Höhe auf die unterste Terrasse verdrängt; Luckau: Chausseerand nach Schlabendorf hart südl. Luckau; Dabern: Ackerrand spärlich.

Geranium sanguineum L.: Drehna: Weinberg. ASCHERSON 1879, heute spärlich.

Geranium molle L.: Drehna: Wüste Kirche (BEHR).

Helianthemum nummularium (L.) Mill.: Crinitz: Kalkgruben nördl. Kl. Bahren und westl. Gahro; Bergen: Trockene Wiese am Moor.

Impatiens noli-tangere L.: Wanninchen: Wassermühle; Glichow: Wassermühle.

Circaea lutetiana L.: Weißack: Tiergarten; Drehnaer Busch.

Circaea alpina L.: Weißack: Ehem. Papiermühle ganz vereinzelt (MILITZER).

Peucedanum oreoselinum (L.) Mnch.: Gahro: Weg nach Kl. Bahren spärlich; Bergen: Trockene Wiese am Moor.

Chimaphila umbellata (L.) Nutt.: Crinitz: Wald westl. Diebitz; Drehna: Abfluß vom Pappelteich; Babben: Pretzlinge.

Pyrola secunda L.: Weißack: Kalkgruben nach Walddrehna.

Pyrola uniflora L.: Babben: Hart nördl. Kalkberge nach Rehain zu; Crinitz: Östl. Bahndamm nach Nord (große Herde).

Ledum palustre L.: Tanneberg: Anmooriger Wald nördl. der Kl. Elster etwa 1 Morgen Flächenraum; Gr. Mehßow: Moor im südl. Teil des Tannenbusches; Stiebsdorf: Elsbruch mit *Myrica* durcheinander.

Vaccinium oxycoccus L.: Drehna: Südufer des Sandteiches und Försterwiese südl. Sandteich zahlreich.

Hottonia palustris L.: Pademagk: Graben am Interessentenweg zum Teich.

Centaureum umbellatum L.: Drehna: Weinberg; Crinitz: Wegrund östl. Niederhof; Försterwiese südl. Sandteich, stets spärlich; Drehna: Raschkenweg.

Gentiana pneumonanthe L.: Bergen: Waldrand am Moor spärlich; Drehna: Försterwiese vereinzelt; Brenitz: Lugeich am Bahngraben zahlr.

Cynoglossum officinale L.: Drehna: Wüste Kirche.

Leonurus cardiaca L.: Crinitz, Bergen, Drehna (Schuttplatz), Walddrehna.

Stachys silvatica L.: Wanninchen: Wassermühle; Gr. Mehßow: Tannenbusch.

Stachys officinalis (L.) Trev.: Bergen: Trockene Wiese am Moor.

Stachys palustris L.: Crinitz: Graben am Fußsteig zum Bhf.

Veronica spicata L.: Bergen: Trockene Wiese am Moor; Crinitz: Wiese an Kalkgruben nördl. Kl. Bahren spärlich.

Melampyrum nemorosum L.: Wanninchen: Wassermühle; Drehna: Busch nach Pademagk zahlr.; Gliedow: Vor Wassermühle zahlr. Stets auch mit weißen Hochblättern. Park von Alt-Döbern (KRAUSCH 1959).

Lathraea squamaria L.: Sonnewalde: Fasanerie bis 1952, dann infolge Versiedlung wahrscheinlich vernichtet.

Pedicularis silvatica L.: Tanneberg: Waldmoor nördl. Kl. Elster; Drößigk: Nach Fischwasser zu mit *Arnica montana*, *Orchys maculata*, *Antennaria dioica*.

Utricularia vulgaris L.: Weißack: Gr. Torfstichteich.

Utricularia minor L.: Bergen: Nähe Kl. Torfstichteich (Nucks Teich).

Asperula odorata L.: Brenitz: Friedersdorfer Tiergarten; Doberlug: Buchwald, Birkbusch, Waldhufe. Überall gepflückt.

Galium boreale L.: Bergen: Trockene Wiese am Moor.

Lonicera periclymenum L.: Drehna: Park; Doberlug: Schweinbusch südl. Forsthaus Forst.

Dipsacus silvester Huds.: Crinitz: Ortsausgang nach Gr.-Mehßow.

Scabiosa columbaria L.: Crinitz: Kalkgruben nördl. Kl. Bahren u. a.

Campanula persicifolia L.: Drehna: Weinberg; Babben: Waldwiese.

Campanula trachelium L.: Drehna: Waldrand am Raschkenweg.

Inula britannica L.: Sonnewalde: Kl. Kraußnigker Tiergarten.

Inula salicina L.: Bergen: Trockene Wiese am Moor; Schwarzenburg: Am Weg zur ehem. Försterei Neusorgefeld an der Chaussee.

Arnica montana L.: Kirchhain: Wiesen an einigen Stellen, z. B. Pfarrwiese; Drößigk: Wiese Mittag und südl. davon zahlr. (TAUBERT 1886) 1957.

Senecio nemorensis L. subsp. *fuchsii* (Gmel.) Durand: Park Drehna im Koniferenbezirk.

Carlina vulgaris L.: Drehna: Park vereinzelt; Bergen: Ehem. Zgl. südl.

Cirsium acaule (L.) Scop.: Kalkgruben nördl. Kl. Bahren; Crinitz: Chaussee nach Drehna neuerdings.

Cirsium oleraceum (L.) Scop.: Gliechower Wassermühle.

Centaurea scabiosa L.: Drehna: Weinberg; Bergen: Südhang, stets spärlich.

Scorzonera humilis L.: Crinitz: Kirchsteig nach Gahro am Waldrand 1954.

Chondrilla juncea L.: Drehna: Chaussee vor der Wüsten Kirche; Doberlug: Bahnhof; Kirchhain: Weinberg.

Außerhalb des Gebietes

Ledum palustre L.: Peitz-Ost: Tiefer Grund in der Kl. Heide über 1 Morgen Fläche üppig.

Chimaphila umbellata (L.) Nutt.: Fundort wie vorstehend.

Centaureum umbellatum L.: Peitz: Teufelswiesen bei Ottendorf 1932.

Vicia cassubica L.: Spremberg: Kurauer Berg bei Neumühle.